

Немножко о гемикраниях: континуа и пароксизмальной

By Галиулина Каринка

Мем для настроения

Стресс



**Мысли о
будущем**



Пароксизмальная гемикrania

- Проявляется приступами с характеристиками боли и сопутствующими симптомами, аналогичными таковым при ПГБ.
- Отличительные симптомы – **кратковременность приступов и их большая частота**
- Чаще – у **женщин**
- Обычно начинается **во взрослом возрасте**, но *может быть* и у детей
- **Специфический признак** этой формы цефалгии – эффективность **индометацина**

- Бывает эпизодическая (ремиссии 1 мес и более) и хроническая (приступы дольше 1 года без ремиссий или с ремиссиями менее 1 мес)
- Известны случаи пароксизмальной гемикрании, сочетающиеся с тригеминальной невралгией (пароксизмальная гемикрания-тик синдром)

Диагностические критерии пароксизмальной гемикрании

- А. Как минимум, 20 приступов, отвечающих критериям D-D.
- В. Приступы интенсивной односторонней боли орбитальной, супраорбитальной или височной локализации продолжительностью 2-30 минут
- С. ГБ сопровождается, как минимум, одним из следующих симптомов:
 - ипсилатеральное инъектирование конъюнктивы и/или слезотечение,
 - ипсилатеральная заложенность носа и/или ринорея,
 - ипсилатеральная отечность века,
 - ипсилатеральная потливость лба и лица,
 - ипсилатеральный миоз и/или птоз.
- D. Преимущественная частота приступов более 5 раз в сутки, иногда несколько реже
- E. Приступы полностью предотвращаются приемом индометацина в терапевтической дозе
- F. ГБ не связана с другими причинами.

Лечение

- Индометацин (внутри или ректально не менее 150 мг/сут или не менее 100 мг в виде инъекции)

Гемикrania континуа

- = продолжительная гемикrania
- Редкая форма персистирующей **строго односторонней** ГБ, сопровождающаяся **вегетативными симптомами** и абсолютно чувствительная к терапии **индометацином**; является одной из форм **ежедневной хронической** головной боли
- Чаще - **у женщин**
- Средний возраст начала – 44 года



3.4 Гемикрания континуа

Критерии диагноза:

- A. Строго односторонняя головная боль отвечающая критериям В–D
- B. Продолжительность >3 месяцев, с обострениями средней или высокой интенсивности
- C. Один или оба из симптомов:
 - 1. по крайней мере, один из следующих симптомов или признаков, ипсилатеральный к головной боли
 - a) инъекцирование конъюнктивы и/или слезотечение
 - b) заложенность носа и/или ринорея
 - c) отечность век
 - d) потливость лба и лица
 - e) миоз и/или птоз
 - 2. чувство беспокойства или возбуждения(ажитация) либо усиление боли при движении
- D. Эффективность терапевтических доз индометацина
- E. Нет более подходящего диагноза МКГБ-3

НЕТ ГОЛОВЫ

НЕТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ