

1. Необходимо определить дизайн исследований. Медикаментозная терапия препаратом «Локатоп» у больных с атопическим дерматитом.

А) РКИ

Б) Исследование по типу случай-контроль

С) Когортное исследование

Д) Описание одного случая/серия случаев

Е) Поперечное исследование

2. Произведено исследование 55 пациентов (30 женщин, 25 мужчин) с диагнозом витилиго. Пациенты применяли мазь Такролимус 0,1% 2р/день в течение 3 месяцев. Репигментация очагов витилиго из 55 пациентов, ответ на терапию был получен у 36, у 19 пациентов не было отмечено никакой реакции на лечение после 3 месяцев лечения. Определите метод исследования.

А) Неконтролируемое исследование

Б) РКИ

С) Поперечное исследование

Д) РКИ Описание отдельных случаев

Е) Когортное исследование

3. При проведении исследования у больных псориазом врач задает вопрос о частоте применения топических глюкокортикостероидов. В данном случае применяется:

А) Поперечное исследование

Б) Когортное исследование

С) Нерандомизированное контролируемое исследование

Д) Систематический обзор

Е) Описание серии случаев

4. Найдите С (Comparison) по PICO:

Приводит ли применение мезотерапии кожи волосистой части головы по сравнению с отсутствием мезотерапии волос к уменьшению частоты выпадения волос.

А) Пациенты с алопецией

Б) Мезотерапия

С) Отсутствие мезотерапии

Д) Уменьшение выпадения волос

5. В исследовании изучалась эффективность приема ретиноидов у пациентов с тяжелой степенью акне. Что в данном случае, что следует считать суррогатной точкой?

А) Уровень печеночных трансаминаз

Б) Сроки исчезновения папуло-пустулезных высыпаний

С) Частота рецидивов

Д) Сроки рубцов

Е) Сроки перехода исключительно к наружной терапии

ОТВЕТЫ:

1 –

2 –

3 –

4 –

5 – А