

Тема: Признаки
монотонности функции.
Экстремум функции.
Исследование функции на
монотонность и экстремум.

Эти определения у вас уже есть!


О п р е д е л е н и е. Функция f *возрастает* на множестве P , если для любых x_1 и x_2 из множества P , таких, что $x_2 > x_1$, выполнено неравенство $f(x_2) > f(x_1)$.

О п р е д е л е н и е. Функция f *убывает* на множестве P , если для любых x_1 и x_2 из множества P , таких, что $x_2 > x_1$, выполнено неравенство $f(x_2) < f(x_1)$.

Иными словами, функция f называется *возрастающей* на множестве P , если большему значению аргумента из этого множества соответствует большее значение функции. Функция f называется *убывающей* на множестве P , если большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции.

$f(x) \nearrow$ при $x \in$

$f(x) \searrow$ при $x \in$



Рассмотрим применение производной к нахождению промежутков возрастания и убывания функций.

Пусть значения производной функции $y = f(x)$ положительны на некотором промежутке, т. е.

$f'(x) > 0$. Тогда угловой коэффициент касательной $\operatorname{tg} \alpha = f'(x)$ к графику этой функции в каждой точке данного промежутка положителен. Это означает, что касательная к графику функции направлена вверх, и поэтому график функции на этом промежутке «поднимается», т. е. функция $f(x)$ возрастает (рис. 120).




Рис. 120

Если $f'(x) < 0$ на некотором промежутке, то угловой коэффициент касательной $\operatorname{tg} \alpha = f'(x)$ к графику

функции $y = f(x)$ отрицателен. Это означает, что касательная к графику функции направлена вниз, и поэтому график функции на этом промежутке «опускается», т. е. функция $f(x)$ убывает (рис. 121).




Рис. 121

Итак, если $f'(x) > 0$ на промежутке, то функция возрастает на этом промежутке.

Если $f'(x) < 0$ на промежутке, то функция $f(x)$ убывает на этом промежутке.

Эти определения у вас уже есть!

Определение. Точка x_0 называется *точкой минимума* функции f , если для всех x из некоторой окрестности x_0 выполнено неравенство $f(x) \geq f(x_0)$ (рис. 42).






Рис. 42

В окрестности точки минимума графики, как правило, изображаются в виде «впадины», тоже или гладкой (рис. 42, б — точка x_0 , рис. 44 — точки x_4, x_5), или заостренной (рис. 42, а — точка x_0 и рис. 44 — точка x_6).



а)



б)

Рис. 43

О п р е д е л е н и е. Точка x_0 называется *точкой максимума* функции f , если для всех x из некоторой окрестности x_0 выполнено неравенство $f(x) \leq f(x_0)$ (рис. 43).

По определению значение функции f в точке максимума x_0 является наибольшим среди значений функции из некоторой окрестности этой точки, поэтому график функции в окрестности x_0 , как правило, имеет вид гладкого «холма» (рис. 43, а и рис. 44 — точки x_1, x_2, x_3) или заостренного «пика» (рис. 43, б).




Рис. 44

Для точек максимума и минимума функции принято общее название — их называют *точками экстремума*. Значения функции в этих точках называют соответственно *максимумами* и *минимумами* функции (общее название — *экстремум функции*). Точки максимума обозначают x_{\max} , а точки минимума x_{\min} . Значения функции в этих точках обозначаются соответственно y_{\max} и y_{\min} .

Внутренние точки области определения функции, в которых ее производная равна нулю или не существует, называются *критическими точками* этой функции. Эти точки играют важную роль при построении графика функции, поскольку только они могут быть точками экстремума функции

288. Найдите критические точки функции:

а) $f(x) = 4 - 2x + 7x^2$;

б) $f(x) = 1 + \cos 2x$;

в) $f(x) = x - 2 \sin x$;

г) $f(x) = 4x - \frac{x^3}{3}$.

900. Найти интервалы возрастания и убывания функции:

1) $y = x^2 - x$;

2) $y = 5x^2 - 3x - 1$;

3) $y = x^2 - 2x$;

4) $y = x^2 + 12x - 100$;

5) $y = x^3 - 3x$;

6) $y = x^4 - 2x^2$;

7) $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 40$;

8) $y = x^3 - 6x^2 + 9$.

2) $y = 5x^2 - 3x - 1$

Функция определена на множестве \mathbb{R} .

$$y' = 10x - 3$$

Производная определена на множестве \mathbb{R} .


Найдем критические точки (т.е. точки, в которых производная равна 0)

$$10x - 3 = 0$$

$$10x = 3$$

$$x = 3/10$$

На числовой прямой отметим критическую точку (она делит область определения на два интервала) и найдем **знак производной** в интервалах.



$$f(x) \uparrow \text{ при } x \in \left[\frac{3}{10}; +\infty \right)$$

$$f(x) \downarrow \text{ при } x \in \left(-\infty; \frac{3}{10} \right]$$

900. Найти интервалы возрастания и убывания функции:

1) $y = x^2 - x;$

2) $y = 5x^2 - 3x - 1;$

3) $y = x^2 - 2x;$

4) $y = x^2 + 12x - 100;$

5) $y = x^3 - 3x;$

6) $y = x^4 - 2x^2;$

7) $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 40;$

8) $y = x^3 - 6x^2 + 9.$

Признак минимума функции. Если функция f непрерывна в точке x_0 , $f'(x) < 0$ на интервале $(a; x_0)$ и $f'(x) > 0$ на интервале $(x_0; b)$, то точка x_0 является точкой минимума функции f .

Удобно пользоваться упрощенной формулировкой этого признака: если в точке x_0 производная меняет знак с минуса на плюс, то x_0 есть точка минимума.

Признак максимума функции. Если функция f непрерывна в точке x_0 , а $f'(x) > 0$ на интервале $(a; x_0)$ и $f'(x) < 0$ на интервале $(x_0; b)$, то точка x_0 является точкой максимума функции f .

Удобно пользоваться упрощенной формулировкой этого признака: если в точке x_0 производная меняет знак с плюса на минус, то x_0 есть точка максимума.

Точками экстремума могут служить только критические точки, т. е. точки, принадлежащие области определения функции, в которых производная $f'(x)$ обращается в нуль или терпит разрыв.

Если при переходе через критическую точку x_0 производная $f'(x)$ меняет знак, то функция $f(x)$ имеет в точке x_0 экстремум: минимум в том случае, когда производная меняет знак с минуса на плюс, и максимум — когда с плюса на минус. Если же при переходе через критическую точку x_0 производная $f'(x)$ не меняет знака, то функция $f(x)$ в точке x_0 не имеет экстремума.

Правило нахождения экстремумов функции $y=f(x)$ с помощью первой производной

I. Найти производную $f'(x)$.

II. Найти критические точки функции $y=f(x)$, т. е. точки, в которых $f'(x)$ обращается в нуль или терпит разрыв.

III. Исследовать знак производной $f'(x)$ в промежутках, на которые найденные критические точки делят область определения функции $f(x)$. При

этом критическая точка x_0 есть точка минимума, если она отделяет промежуток, в котором $f'(x) < 0$, от промежутка, в котором $f'(x) > 0$, и точка максимума — в противном случае. Если же в соседних промежутках, разделенных критической точкой x_0 , знак производной не меняется, то в точке x_0 функция экстремума не имеет.

IV. Вычислить значения функции в точках экстремума.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1;$$

Например:

Функция определена на множестве \mathbb{R} .

$$y' = 3x^2 - 6x$$

Производная определена на множестве \mathbb{R} .


Найдем критические точки (т.е. точки, в которых производная равна 0)

$$3x^2 - 6x = 0$$

$$3x(x-2) = 0$$

$$x = 0 \text{ или } x = 2$$

На числовой прямой отметим критические точки (они делят область определения на три интервала) и найдем **знак производной** в интервалах.



Чтобы найти экстремумы, надо значения точек экстремума подставить **в функцию**.

$$x_{\max} = 0, y_{\max} = 1$$

$$x_{\min} = 2, y_{\min} = -3$$

Исследовать функцию на монотонность и экстремумы:

281. а) $f(x) = 12x + 3x^2 - 2x^3$; б) $f(x) = 4 - x^4$;

в) $f(x) = x(x^2 - 12)$; г) $f(x) = \frac{3}{x^2}$.

283. а) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$; б) $f(x) = 4x^3 - 1,5x^4$;

в) $f(x) = 2 + 9x + 3x^2 - x^3$; г) $f(x) = x^4 - 2x^2$.