

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom sides of the slide, framing the central text.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Врач: Кучерявый С.Г.
Докладчик: Халенко В.В.4 курс

К. Татьяна Павловна

Поступила на родильное отделение (4.10.16 14:18) с жалобами на регулярные схватки .


Начало сваток 10:00, отхождение вод 10:00, начало потуг 17:10

- Возраст: 29 лет
- Заболевания: субклинический гипотиреоз (ТТГ- 1.3 ммоль/л), аутоиммунный тиреоидит.
- Анамнез: 2016- замершая беременность. Угроза прерывания в 12 нед, госпитализация. 3 триместр – анемия тяжелой степени
- Диагноз при поступлении: беременность 39 недель.

Объективный статус

- ЧСС 86 уд.мин, АД 110/70
- Матка возбудима безболезненная при пальпации.
- Схватки умеренноболезненные, регулярные, через 4 мин по 40 сек.
- Положение плода продольное, головка прижата ко входу в малый таз.
Сердцебиение 137 уд.мин.
- **Distantia spinarum: 26 см Distantia cristarum 29 см Distantia trochanterica 31 см Conjugata externa 20 см**
- Ромб Михаэлиса 11*11
- Индекс Соловьева 15.5 см.
- Fundus 29см. ОЖ 92 см. ПОЖ 27см. ПМП (по Рудакову)= 2800-2900 г

КТГ



4.10.16 17:10

- По данным мониторингового наблюдения – урежение ЧСС плода до 60-70 уд/мин без выравнивание до базального уровня. Патологических выделений из половых путей нет.
- Роженица тужится по 60 сек, каждые 3-4 мин..
- Вагинально: раскрытие маточного зева полное. Головка плода на тазовом дне. Стреловидный шов в прямом размере, малый родничок сверху и спереди.
- Поставлен диагноз - начавшаяся гипоксия плода, решено закончить роды наложением выходных акушерских щипцов

17:35 Осмотр и ушивание мягких родовых путей

- Шейка матки целая. Своды целые. Стенки влагалища – скальпированный линейный разрыв на боковой стенке в нижней трети влагалища длиной 3 см. Рана промежности ушивается послойно.
- Перинеотомия. Перинеорафия.
- Моча выпущена катетером. Общая кровопотеря – 300мл.
- Назначение: лед к промежности, Метилэргометрин 1.0 мл в/в. Окситоцин 1.0 в/м,

1 период- 7 ч 10 мин

2 период – 10 минут

3 период – 5 минут

Безводный промежуток 7 ч 20 минут

19:40

- Состояние удовлетворительное. АД- 110/70. Дно матки на уровне 16 см выше лона, Выделения умеренные, кровянистые. Легкий отек промежности
- Перевод в 1 послеродовое отделение.
- Диагноз заключительный: Роды 1 срочные. Раннее излитие вод (светлые). Rh (-) кровь без АТ. Субкоменсированный гипотериоз

Новорожденный

- Живой, доношенный
- Масса 3650 кг. Рост 53 см. окружность головы 35 см. окружность груди 34 см.
- Шкала Апгар

Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар

Время после рождения	Сердцебиение	Дыхание	Окраска кожи	Тонус мышц	Рефлексы	Оценка в баллах
1	2	2	1	1	1	7/10
5	2	2	1	1	2	8/8

Всего баллов 15/15

- Внутриутробная гипоксия в родах. Состояние ребенка – средней степени тяжести, за счет умеренной неврологической симптоматики. Травматизации черепа на Rg не обнаружено.
- Выписан на 5 день жизни. Без патологий. Рекомендован воротник Шанца, консультация ортопеда