

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»

Презентация:

по ПМ 01. МДК 01.02. «Основы профилактики»


на тему: **«Современные аспекты заболеваний передающихся половым путем»**

Выполнила: Бурова И. М.

Студентка: 36-с группы 1 подгруппы


Преподаватель: Евтушенко И.В.

Симферополь, 2019 г



ПРОФИЛАКТИКА ЗППП – ЭТО КОМПЛЕКС
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ.

ПРОФИЛАКТИКА ЗППП ДОЛЖНА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ И
ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ.



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ:

- Распространение информации об опасности ЗППП и методах их профилактики через средства массовой информации.
- Проведение бесед, лекций, семинаров в образовательных учреждениях для учащихся.
- Организация центров помощи подросткам.
- Привлечение общественных организаций ВИЧ – инфицированных.
- Подготовка волонтеров из среды молодёжи.
- Привлечение для волонтерской работы студентов медицинских колледжей.



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЕ:

- Разработка и внедрение образовательных программ по половому воспитанию для различных групп населения.
- Учёт заболеваемости, своевременность госпитализации, быстрое выявление и привлечение к лечению всех контактировавших и источников заражения.
- Выявление венерических заболеваний в акушерско – гинекологических учреждениях.
- Обязательные профилактические медицинские обследования на венерические заболевания ряда контингентов.
- Серологический контроль за больными, находящимися в общесоматических стационарах.
- Серологическое обследование (двукратное) беременных с целью профилактики врожденного сифилиса.



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗППП НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ:

- Обучение пациентов из групп риска для снижения заболеваемости ЗППП.
- Выявление инфицированных лиц с асимптомным течением и имеющих симптомы заболевания.
- Эффективная диагностика и лечение инфицированных пациентов.
- Выявление, лечение и консультирование сексуальных партнёров пациентов, страдающих ЗППП.
- Воздержание от половой жизни с инфицированным половым партнёром, воздержание от случайных связей.



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗППП НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ:

- Использование барьерных средств контрацепции и антисептиков.
- Предварительная вакцинация.
- Профилактическое лечение.
- Обязательная госпитализация больных с заразными формами сифилиса и гонореи.
- Контроль излеченности больных.
- Обязательное посещение уролога \ гинеколога каждые полгода.



ПАЦИЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ:

- Потребители внутривенных наркотиков.
- Лица, занимающиеся коммерческим сексом.
- Подростки.
- Беременные.
- Медицинские работники.



ИНФИЦИРУЮЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ (С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
РИСКА):

- Кровь, плазма.
- Семенная жидкость.
- Вагинальный секрет.



ИНФИЦИРУЮЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ (СО СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА):

- Спинномозговая жидкость.
- Синовиальная жидкость.
- Плевральная жидкость.
- Перитониальная жидкость.
- Грудное молоко.



НЕ ОПАСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ (ЕСЛИ НЕ СОДЕРЖАТ КРОВИ)

- Слюна.
- Слёзная жидкость.
- Моча.
- Пот.
- Фекалии.



ЗАЩИТА ПРОТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ:

- Сведение к минимуму манипуляций с использованными иглами, отказ от надевания защитных колпачков на одноразовые иглы после их применения.
- Мытье рук с мылом после контакта с кровью или жидкостями человеческого организма.
- Использование перчаток.
- Защита поврежденной кожи или открытых ран водонепроницаемыми повязками.
- Использование индивидуальных средств защиты глаз, лица (маска, очки, щиток).
- Передача всех острых инструментов через промежуточный лоток.



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ – ЭТО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ
ДВУХСТОРОННЕЕ ОБЩЕНИЕ С
ПАЦИЕНТОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОМОЧЬ ЕМУ ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ ИЛИ СПРАВИТЬСЯ С
ЧУВСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С
ЕГО СОСТОЯНИЕМ ИЛИ
СИТУАЦИЕЙ.

ЭТО ФОРМА ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ.



ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:

- Информирование пациента.
 - Помощь в анализе возникшей ситуации.
 - Поиск путей решения проблемы.
 - Обсуждение задач и причин консультации.
 - Оценка степени риска заражения ЗППП и ВИЧ-инфекции.
 - Определение эмоциональных реакций и последствий осведомленности пациента о наличии ЗППП или ВИЧ-инфекции, оказание ему психологической поддержки.
 - Профилактика распространения ЗППП и ВИЧ-инфекции.
 - Обучение навыкам безопасного в плане заражения ЗППП и ВИЧ-инфекцией поведения.
- 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:

- Наличие достаточного времени.
- Доступность консультации.
- Уважение к личности каждого пациента, доброжелательность.
- Конфиденциальность.
- Требования к помещению.
- Уважение способности индивидуума принимать решение.
- Предоставление информации на языке, понятном пациенту.



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА, ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗППП.
НАВЫКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ СО
СВОИМИ ПАЦИЕНТАМИ.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- [«https://www.dissercat.com/content/mediko-sotsialnye-i-organizatsionnye-aspekty-realizatsii-territorialnykh-programm-po-profila](https://www.dissercat.com/content/mediko-sotsialnye-i-organizatsionnye-aspekty-realizatsii-territorialnykh-programm-po-profila)
- <https://dzhmao.ru/info/profilaktika/venericheskie-bolezni.php>
- <https://www.12stom.by/polezno-znat/stati/187-profilaktika-infektsij-peredayushchikhsya-polovym-putem.html>
- **"Кожные и венерические болезни. Диагностика, лечение и профилактика. Учебник» Кочергин Николай Георгиевич, ГЭОТАР-Медиа, 2018 г.**

