Психологические расстройства и состояния

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БЛИЗОСТИ РОДСТВА И КОЛИЧЕСТВА БОЛЬНЫХ РОДСТВЕННИКОВ



	Процент заболеваемости в зависимости от степени родства						
	Среднестат заб-ть	Один из родите- лей	оба родителя	M3	Сиблинг и ДЗ близнец	Дядя Ітетя	
Шизофрения	1	12-14	35-40	45	15-16	5-6	
Депрессия	10	15	30	40	16	10-12	
Бипогвірное расстройство	1	16	75	56	16	8-10	
РДА	2	-	-	75- 90	10 (35)	-	

РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА БОЛЬНОГО РОДСТВЕННИКА



Шизофрения	С одинаковой частотой мужчины и женщины	
Депрессия	Женщины в 2 раза чаще	
Биполярное расстройство	С одинаковой частотой мужчины и женщины	
РДА	Мужчины в 4 раза чаще, чем женщины	
СДВГ	Мужчины до 10 раз чаще, чем женщины	
Неспособность к обучению	Мужчины в 5 раз чаще, чем женщины	
Алкогопизм	Мужчины в 4 раза чаще, чем женщины	

ПРИМЕРЫ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, КОРРЕЛИРУЮЩИХ С РАЗВИТИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ



Шизофрения	агедония, повышенная чувствительность, робость, замкнутость, эмоциональная хоподность, параноидные установки
Депрессия	интроверсия, ранимость, тревожность, склонность к самообвинению, сниженная адаптивность
Биполярное расстройство	экстраверсия, нацеленность на социальные достижения, выраженные колебания активности и настроения (циклотимия)
Алкоголизм и наркомании	стремпение к одиночеству, гедонизм, импульсивность, гиперактивность, нарушения поведения, тревога и депрессия, внешний локус контроля; школьная неуспешность, отсутствие взаимопонимания с родителями

ПО ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ выделяют: ПОЛИПЕПТИДЫ **АМИНЫ АМИНОКИСЛОТЫ** ГЛИЦИН ДОФАМИН ВЕЩЕСТВО Р ГАММА-АМИНО-

ДОФАМИН НОРАДРЕНАЛИН СЕРОТОНИН ГИСТАМИН ГЛИЦИН
ГАММА-АМИНОМАСЛЯНАЯ К-ТА
ГЛУТАМАТ
АСПАРТАТ

ВЕЩЕСТВО Р ЭНКЕФАЛИНЫ И ЭНДОРФИНЫ

ПРИМЕРЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Шизофрения	Дофаминовая теория (увепичение активности дофаминергической системы мозга)	
Депрессия	Понижение активности серотонина и норадреналина	
Маниакальная фаза биполярного расстройства	Повышение активности норадреналина при низком уровне серотонина	
Алкоголизм	Алкогопьдегидрогеназа (высокая активность фермента)	
Суицидальное поведение	Серотониновая теория (низкий уровень серотонина, особенно в лобных долях)	

ПРИМЕРЫ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Шизофрения	дистанцирующий стиль воспитания, жестокость и непоспедовательность со стороны взроспых, социальная изоляция	
Депрессия	любые стрессы, употребление ПАВ	
Маниакальная фаза биполярного расстройства	Сезонные колебания светового дня, укорочение сна, злоупотребление психостимуляторами, укорочение сна	
Алкоголизм	Одиночество, формирование круга общения среди людей, попожительно относящихся к употреблени алкоголя	
Суицидальное поведение	Злоупотребление ПАВ, низкий уровень хопестерина, жестокое обращение в детстве	