

Психологические расстройства и состояния

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БЛИЗОСТИ РОДСТВА И КОЛИЧЕСТВА БОЛЬНЫХ РОДСТВЕННИКОВ



Процент заболеваемости в зависимости от степени родства

	<i>Среднестат заб-ть</i>	<i>Один из родителей</i>	<i>оба родители</i>	<i>МЗ</i>	<i>Сиблинг и ДЗ близнец</i>	<i>Дядя /тетя</i>
Шизофрения	1	12-14	35-40	45	15-16	5-6
Депрессия	10	15	30	40	16	10-12
Биполярное расстройство	1	16	75	56	16	8-10
РДА	2	-	-	75-90	10 (35)	-

РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА БОЛЬНОГО РОДСТВЕННИКА



Половые различия в заболеваемости

Шизофрения	С одинаковой частотой мужчины и женщины
Депрессия	Женщины в 2 раза чаще
Биполярное расстройство	С одинаковой частотой мужчины и женщины
РДА	Мужчины в 4 раза чаще, чем женщины
СДВГ	Мужчины до 10 раз чаще, чем женщины
Неспособность к обучению	Мужчины в 5 раз чаще, чем женщины
Алкоголизм	Мужчины в 4 раза чаще, чем женщины

ПРИМЕРЫ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, КОРРЕЛИРУЮЩИХ С РАЗВИТИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ



Шизофрения	агедония, повышенная чувствительность, робость, замкнутость, эмоциональная холодность, параноидные установки
Депрессия	интроверсия, ранимость, тревожность, склонность к самообвинению, сниженная адаптивность
Биполярное расстройство	экстраверсия, нацеленность на социальные достижения, выраженные колебания активности и настроения (циклотимия)
Алкоголизм и наркомания	стремление к одиночеству, гедонизм, импульсивность, гиперактивность, нарушения поведения, тревога и депрессия, внешний локус контроля; школьная неуспешность, отсутствие взаимопонимания с родителями



ПО ХИМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ
ВЫДЕЛЯЮТ:

АМИНЫ

ДОФАМИН
НОРАДРЕНАЛИН
СЕРОТОНИН
ГИСТАМИН

АМИНОКИСЛОТЫ

ГЛИЦИН
ГАММА-АМИНО-
МАСЛЯНАЯ К-ТА
ГЛУТАМАТ
АСПАРТАТ

ПОЛИПЕПТИДЫ

ВЕЩЕСТВО P
ЭНКЕФАЛИНЫ И
ЭНДОРФИНЫ

ПРИМЕРЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Шизофрения	Дофаминовая теория (увеличение активности дофаминергической системы мозга)
Депрессия	Понижение активности серотонина и норадреналина
Маниакальная фаза биполярного расстройства	Повышение активности норадреналина при низком уровне серотонина
Алкоголизм	Алкогольдегидрогеназа (высокая активность фермента)
Суицидальное поведение	Серотониновая теория (низкий уровень серотонина, особенно в лобных долях)

ПРИМЕРЫ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Шизофрения	дистанцирующий стиль воспитания, жестокость и непоследовательность со стороны взрослых, социальная изоляция
Депрессия	любые стрессы, употребление ПАВ
Маниакальная фаза биполярного расстройства	Сезонные колебания светового дня, укорочение сна, злоупотребление психостимуляторами, укорочение сна
Алкоголизм	Одиночество, формирование круга общения среди людей, положительно относящихся к употреблению алкоголя
Суицидальное поведение	Злоупотребление ПАВ, низкий уровень холестерина, жестокое обращение в детстве