

# РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ВНАСЛІДОК НАГРІВАННЯ (ОХОЛОДЖЕННЯ) ТІЛА

8 клас



## Вправа № 8

---

---

1. Питома теплоємність срібла дорівнює  $250 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$ . Що це означає?
2. Чому в системах охолодження найчастіше використовують воду?
3. Сталеву ложку масою 40 г нагріли в окропі (у воді за температури  $100^\circ\text{C}$ ). Яка кількість теплоти пішла на нагрівання ложки, якщо її температура збільшилася від  $20$  до  $80^\circ\text{C}$ ?
4. Щоб нагріти деталь масою 250 г на  $160^\circ\text{C}$ , їй було передано 20 кДж теплоти. З якого матеріалу виготовлено деталь?



Обчислити кількість теплоти, потрібну для нагрівання алюмінієвої ложки масою 50 г від 20 до 90 °С

$$Q = cm\Delta t$$

$$Q = cm(t_2 - t_1)$$



До якої температури охолоне 5 л окропу, віддавши в навколишнє середовище 1680 кДж теплоти?

$$Q = cm\Delta t$$


$$Q = cm(t_1 - t_2)$$

$$t_1 - t_2 = \frac{Q}{cm}$$

$$t_2 = t_1 - \frac{Q}{cm}$$




На малюнку зображено графік фізичного процесу. Що це за процес? Якщо вважати, що процес відбувається з речовиною масою 100 г, чи можна встановити, що це за речовина?



$$c = \frac{Q}{m\Delta t}$$



На малюнку зображено графіки залежності кількості теплоти від зміни температури для трьох тіл однакової маси, але виготовлених із різних матеріалів. Порівняйте питомі теплоємності цих тіл.



$$c = \frac{Q}{m\Delta t}$$





**Задача.** У залізну каструлю масою 1 кг налито води масою 2 кг. Якої кількості теплоти треба надати каструлі з водою, щоб вода закипіла? Початкова температура води 10 °С.

<b>Дано:</b> $m_1 = 1 \text{ кг}$ $c_1 = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$ $m_2 = 2 \text{ кг}$ $c_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}}$ $t_0 = 10^\circ\text{С}$ $t = 100^\circ\text{С}$	<b>СІ</b>	<b>Розв'язання:</b> Розв'язуючи задачу, слід враховувати, що обидва тіла — каструля і вода — нагріваються разом. Між ними відбувається теплообмін, їхні температури можна вважати однаковими. Тому температура і каструлі, й води змінилися однаково: $\Delta t = 100^\circ\text{С} - 10^\circ\text{С} = 90^\circ\text{С}.$
$Q - ?$		

Але кількості теплоти, що їх дістали каструля і вода, не будуть однаковими, бо маси й питомі теплоємності цих тіл різні.

Кількість теплоти, яку дістала каструля:  $Q_1 = c_1 m_1 \Delta t,$

$$Q_1 = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}} \cdot 1 \text{ кг} \cdot 90^\circ\text{С} = 41\,400 \text{ Дж}.$$

Кількість теплоти, що дістала вода:  $Q_2 = c_2 m_2 \Delta t,$

$$Q_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{С}} \cdot 2 \text{ кг} \cdot 90^\circ\text{С} = 756\,000 \text{ Дж}.$$

Для нагрівання каструлі й води затрачено кількість теплоти:  $Q = Q_1 + Q_2,$

$$Q = 40 \text{ кДж} + 760 \text{ кДж} = 800 \text{ кДж}.$$

**Відповідь:**  $Q = 800 \text{ кДж}.$



В алюмінієвій каструлі масою 900 г нагрівається вода об'ємом 5 л від 20 °С до кипіння. Порівняйте, яка кількість теплоти витрачається на нагрівання каструлі та на нагрівання води.

$$Q_1 = c_1 m_1 (t_2 - t_1)$$

$$Q_2 = c_2 m_2 (t_2 - t_1)$$





# ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

Повторити § 8, виконати вправу 8 (5-7)

ПРИКЛАДИ

5. Як відомо,  $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ . Чи можемо ми сказати, що питома теплоємність залежить від маси речовини? від зміни температури речовини? від кількості переданої теплоти?
6. В алюмінієвій каструлі масою 500 г нагріли 1,5 кг води від 20 °С до кипіння. Яку кількість теплоти передано каструлі з водою?
7. На яку висоту можна підняти вантаж масою 2 т, якщо вдалося б використати всю енергію, що звільняється під час остигання 0,5 л води від 100 до 0 °С ?

№ 7 – на високий рівень. Підказка:  $E = mgh$  ;  $E = Q$

