

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский  
колледж»

---

# ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ

## Что такое сыпь?

**Сыпь** – это внешние изменения кожного покрова и слизистых появляющаяся вследствие как правило различных заболеваний и измененных состояний организма. Очень часто высыпания являются сигналом о присутствии раздражителя или определенной патологии. Инфекция также вызывает измененные состояния кожного покрова, рассмотрим причины этих явлений ниже.

Основными причинами образования сыпи являются:

- инфекции;
- аллергические реакции;
- сердечно-сосудистые патологии.

Часто покраснения появляются из-за попадания в организм инфекции. Тогда имеются и иные симптомы: лихорадка, озноб, боли в горле или животе, кашель, понос, насморк.

Нередко сыпь проявляется как симптом аллергии. В этом случае она практически всегда сопровождается сильным зудом. Поводом заподозрить такое является отсутствие симптомов заражения и контакт с вероятным аллергеном.

## Виды и типы высыпаний

**Различают первичные и вторичные элементы.** К первичным относят сформировавшиеся самостоятельно при патологиях или внешних причинах. К вторичным - возникшие на фоне первых как результат заживления или осложнения.

---

## ПЕРВИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

К ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСЯТСЯ:  
сформировавшиеся самостоятельно при  
патологиях или внешних причинах

**РОЗЕОЛА** - ПЯТНО МАЛОГО ДИАМЕТРА, НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ РОЗОВАТОГО ЦВЕТА.  
**ПЯТНО. КРУПНАЯ ПЛОСКАЯ РОЗЕОЛА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ ОТ 3 ДО 30 ММ.**





## **ЭРИТЕМА.**

**БОЛЬШИЕ КРАСНЫЕ ПЯТНА, ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПЯТЕН, СФОРМИРОВАННЫХ РАСШИРЕНИЕМ СОСУДОВ.**

---



## **ГЕМОМРАГИЯ.**

**ТОЧЕЧНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ВИДЕ МАЛОГО ПЯТНА КРАСНОГО ИЛИ ЛИЛОВОГО ЦВЕТА. ПО МЕРЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ - ЖЕЛТОВАТО-ЗЕЛЕНОВОГО И ЖЕЛТОГО.**

---



## **ПАПУЛА**

**ОБЪЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, РАЗМЕРЫ ВАРИРУЮТСЯ ОТ 2 ДО 25 ММ,  
ФОРМА И ОКРАС ПОХОЖИ НА РОЗЕОЛУ ИЛИ ПЯТНО.**

**БУГОРОК. ПЛОТНОЕ, ОБЪЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛИНОЙ ОТ 2 ДО 20  
ММ. ИМЕЕТ СЕРЕДИНУ БЕЛОГО ЦВЕТА ЗА СЧЁТ СКОПЛЕНИЯ  
ИНФИЛЬТРАТА.**





## **УЗЕЛ**

**ОГРАНИЧЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ ВГЛУБЬ КОЖИ. ВЕЛИЧИНА  
ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ СОВСЕМ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ, В НЕКОТОРЫХ  
СЛУЧАЕВ, КУРИНОГО ЯЙЦА. ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА СКОПЛЕНИЯ  
ИНФИЛЬТРАЦИИ В ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКЕ.**



**ГНОЙНИЧЕК -ПУСТУЛА (ОТ ЛАТ. PUS – ГНОЙ) – ПОЛОСТЬ В ЭПИДЕРМИСЕ, ВЫПОЛНЕННАЯ ГНОЙНЫМ ЭКССУДАТОМ**





## **ВОЛДЫРИ**

**ВОЗВЫШАЮЩИЙСЯ ПОЛОСТНОЙ ЗУДЯЩИЙ БЛЕДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТ 2-15 СМ. ИМЕЕТ ОКРУГЛУЮ ФОРМУ, ЦВЕТ БЛЕДНЫЙ.**

---



## **ПУЗЫРЕК**

**ЭЛЕМЕНТ РАЗМЕРОМ ОТ 1 ДО 5 ММ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ  
ОТСЛОЙКУ КОЖИ, С ПРОЗРАЧНЫМ СОДЕРЖИМЫМ. ПРИ ВЫСЫХАНИИ  
ОБРАЗУЕТ КОРОЧКУ.**



## **ПУЗЫРЬ**

**ПОЛОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ, ДИАМЕТРОМ ДО 3-5 СМ, НАХОДИТСЯ В  
ВЕРХНИХ СЛОЯХ КОЖИ.**





---

**ВТОРИЧНЫЕ**  
**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

**ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ  
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ  
ПРОИСХОДЯЩИХ ПОСЛЕ  
ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СЫПИ.**



## **ЧЕШУЙКА**

**СКОПЛЕНИЕ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК И ПРИЛЕЖАЩИХ СЛОЕВ**

---

**ЭПИДЕРМИСА. ОБРАЗУЮТСЯ НА ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ.**



**ЭРОЗИЯ**  
**ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДЕФЕКТ КОЖИ.**

---



## ССАДИНА

НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭПИДЕРМИСА ИЗ-ЗА РАСЧЕСОВ.

---



## **ЯЗВА**

**ДЕФЕКТ, ДОСТИГАЮЩИЙ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ КОЖИ, МЫШЕЧНОЙ И  
КОСТНОЙ ТКАНИ.**

---



**РУБЕЦ**  
**ЗАКРЫТИЕ ДЕФЕКТА ФИБРОЗНОЙ ТКАНЬЮ.**

---



**ЛИХЕНИФИКАЦИЯ**  
**ОЧАГ УТОЛЩЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА.**

---



## **ТРЕЩИНА**

**ЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ ДЕФЕКТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЕЕ СУХОСТИ ИЛИ ПОТЕРИ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ.**



## **ВЕГЕТАЦИЯ**

**ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРАСТАНИЯ ШИПОВИДНОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА  
И СОСОЧКОВОГО СЛОЯ ДЕРМЫ**

