

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский
колледж»

ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ

Что такое сыпь?

Сыпь – это внешние изменения кожного покрова и слизистых появляющаяся вследствие как правило различных заболеваний и измененных состояний организма. Очень часто высыпания являются сигналом о присутствии раздражителя или определенной патологии. Инфекция также вызывает измененные состояния кожного покрова, рассмотрим причины этих явлений ниже.

Основными причинами образования сыпи являются:

- инфекции;
- аллергические реакции;
- сердечно-сосудистые патологии.

Часто покраснения появляются из-за попадания в организм инфекции. Тогда имеются и иные симптомы: лихорадка, озноб, боли в горле или животе, кашель, понос, насморк.

Нередко сыпь проявляется как симптом аллергии. В этом случае она практически всегда сопровождается сильным зудом. Поводом заподозрить такое является отсутствие симптомов заражения и контакт с вероятным аллергеном.

Виды и типы высыпаний

Различают первичные и вторичные элементы. К первичным относят сформировавшиеся самостоятельно при патологиях или внешних причинах. К вторичным - возникшие на фоне первых как результат заживления или осложнения.

ПЕРВИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

К ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСЯТСЯ:
сформировавшиеся самостоятельно при
патологиях или внешних причинах

РОЗЕОЛА - ПЯТНО МАЛОГО ДИАМЕТРА, НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ РОЗОВАТОГО ЦВЕТА.
ПЯТНО. КРУПНАЯ ПЛОСКАЯ РОЗЕОЛА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ ОТ 3 ДО 30 ММ.





ЭРИТЕМА.

БОЛЬШИЕ КРАСНЫЕ ПЯТНА, ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПЯТЕН, СФОРМИРОВАННЫХ РАСШИРЕНИЕМ СОСУДОВ.



ГЕМОМРАГИЯ.

ТОЧЕЧНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ВИДЕ МАЛОГО ПЯТНА КРАСНОГО ИЛИ ЛИЛОВОГО ЦВЕТА. ПО МЕРЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ - ЖЕЛТОВАТО-ЗЕЛЕНОВОГО И ЖЕЛТОГО.



ПАПУЛА

**ОБЪЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, РАЗМЕРЫ ВАРИРУЮТСЯ ОТ 2 ДО 25 ММ,
ФОРМА И ОКРАС ПОХОЖИ НА РОЗЕОЛУ ИЛИ ПЯТНО.**

**БУГОРОК. ПЛОТНОЕ, ОБЪЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛИНОЙ ОТ 2 ДО 20
ММ. ИМЕЕТ СЕРЕДИНУ БЕЛОГО ЦВЕТА ЗА СЧЁТ СКОПЛЕНИЯ
ИНФИЛЬТРАТА.**



УЗЕЛ

**ОГРАНИЧЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ ВГЛУБЬ КОЖИ. ВЕЛИЧИНА
ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ СОВСЕМ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ, В НЕКОТОРЫХ
СЛУЧАЕВ, КУРИНОГО ЯЙЦА. ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА СКОПЛЕНИЯ
ИНФИЛЬТРАЦИИ В ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКЕ.**



ГНОЙНИЧЕК -ПУСТУЛА (ОТ ЛАТ. PUS – ГНОЙ) – ПОЛОСТЬ В ЭПИДЕРМИСЕ, ВЫПОЛНЕННАЯ ГНОЙНЫМ ЭКССУДАТОМ





ВОЛДЫРИ

ВОЗВЫШАЮЩИЙСЯ ПОЛОСТНОЙ ЗУДЯЩИЙ БЛЕДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТ 2-15 СМ. ИМЕЕТ ОКРУГЛУЮ ФОРМУ, ЦВЕТ БЛЕДНЫЙ.



ПУЗЫРЕК

**ЭЛЕМЕНТ РАЗМЕРОМ ОТ 1 ДО 5 ММ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ
ОТСЛОЙКУ КОЖИ, С ПРОЗРАЧНЫМ СОДЕРЖИМЫМ. ПРИ ВЫСЫХАНИИ
ОБРАЗУЕТ КОРОЧКУ.**



ПУЗЫРЬ

**ПОЛОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ, ДИАМЕТРОМ ДО 3-5 СМ, НАХОДИТСЯ В
ВЕРХНИХ СЛОЯХ КОЖИ.**





ВТОРИЧНЫЕ
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

**ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ
ПРОИСХОДЯЩИХ ПОСЛЕ
ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СЫПИ.**

ЧЕШУЙКА

СКОПЛЕНИЕ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК И ПРИЛЕЖАЩИХ СЛОЕВ

ЭПИДЕРМИСА. ОБРАЗУЮТСЯ НА ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ.



ЭРОЗИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДЕФЕКТ КОЖИ.



ССАДИНА

НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭПИДЕРМИСА ИЗ-ЗА РАСЧЕСОВ.



ЯЗВА

**ДЕФЕКТ, ДОСТИГАЮЩИЙ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ КОЖИ, МЫШЕЧНОЙ И
КОСТНОЙ ТКАНИ.**



РУБЕЦ
ЗАКРЫТИЕ ДЕФЕКТА ФИБРОЗНОЙ ТКАНЬЮ.



ЛИХЕНИФИКАЦИЯ
ОЧАГ УТОЛЩЕНИЯ ЭПИДЕРМИСА.



ТРЕЩИНА

ЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ ДЕФЕКТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЕЕ СУХОСТИ ИЛИ ПОТЕРИ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ.



ВЕГЕТАЦИЯ

**ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРАСТАНИЯ ШИПОВИДНОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА
И СОСОЧКОВОГО СЛОЯ ДЕРМЫ**

