Тест баланс Берга. Риск падения

Первое падение и падения в анамнезе

Шкала равновесия Берга менее 42

Тест «встать и идти на время» более 30с

Сила ноги менее 25б (MI) (меньше 19 в quadriceps)

Пункты 1, 2 и 4 есть у пациента, то риск падений 80%

Тест баланс Берга. Риск падения

408 Пациента, живущих дома

36% падают более одного раза

21% падали однажды

43% не падали

BBS - хороший предиктор падения

- Tilson JK, Wu SS, Cen SY, Feng Q, Rose DR, Behrman AL, Azen SP, Duncan PW. Characterizing and identifying risk for falls in the LEAPS study: a randomized clinical trial of interventions to improve walking poststroke. Stroke. 2012 Feb;43(2):446-52.

Риск падения Mackintosh 2006

- 46% пациентов поле инсульта падают 2 раза в течение первых 6 месяцев после инсульта
- 55% из этой группы получают травмы и 8% что-то ломают

Шкала равновесия берга (BBS)

Цель: предназначен для оценки статического равновесия и оценки риска падения

МКФ\ICF: уровень активности

Время администрирования: 15-20 минут

Дополнительное оборудование: секундомер, стул с подлокотниками, рулетка, ступенька

■ Berg, K. O., Wood-Dauphinee, S. L., et al. (1992). "Measuring balance in the elderly: validation of an instrument." Can J Public Health 83 Suppl 2: S7-11

Шкала равновесия берга (BBS)

Шкала равновесия Берга

Исследование	Баллы
1.Из положения сидя в положение стоя	
2.Положение стоя без поддержки	
3.Положение сидя без поддержки (ноги на полу)	
4.Из положения стоя в положение сидя	
5.Перемещение со стула с подлокотниками на стул без	
подлокотников	
6.Положение стоя без поддержки с закрытыми глазами	
7.Положение стоя без поддержки, ноги вместе	
8.Движение вперед с вытянутыми руками	
9.Поднять предмет с пола	
10.Обернуться и посмотреть через левое и правое плечо	
11.Оборот на 360 градусов	
12.Попеременное касание ступеньки	
13.Положение стоя без поддержки, одна нога впереди	
другой	
14.Положение стоя на одной ноге	
Общее количество баллов	

Шкала равновесия берга (BBS)

- Шкала баланса Берга
 - < 42/56 высокий риск падения

