

# РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ



# Этиология

Причины до сих пор не выяснены. В настоящее время уделяется внимание внешним факторам и наследственности.

# Клиника:

- быстро наступающее снижение остроты зрения
- чувство пелены перед глазом
- боль в области орбиты
- изменения полей зрения
- изменения цветоощущения
- изменение зрачковых реакций
- горизантальный,вертикальный нистагм
- оксоклонус-синдром «танцующих глаз»

# Изменения полей зрения при поражении хиазмы при рассеянном склерозе

- битемпоральное сужение с центральными скотомами
- битемпоральное сужение с битемпоральными парацентральными скотомами
- битемпоральное сужение с темпоральной скотомой на одном глазу
- битемпоральные центральные скотомы без сужения границ
- битемпоральное сужение без скотом



# Изменения на глазном дне:

- бледность диска зрительного нерва, преимущественно с височной стороны
- экссудат в области физиологической экскавации дзн
- отёк макулы
- серозная отслойка пигментного эпителия

# «Классические» неврологические синдромы:

- триада Шарко-нистагм, интенционное дрожание, мозжечковая дизартрия
- триада Марбурга-центральные парезы, отсутствие брюшных рефлексов, побледнение височных половин ДЗН
- триада Нонне-расстройства координации движений, гиперметрия, мозжечковая дизартрия



**Спасибо за внимание!**