

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Этиология

Причины до сих пор не выяснены. В настоящее время уделяется внимание внешним факторам и наследственности.

Клиника:

- быстро наступающее снижение остроты зрения
- чувство пелены перед глазом
- боль в области орбиты
- изменения полей зрения
- изменения цветоощущения
- изменение зрачковых реакций
- горизантальный,вертикальный нистагм
- оксоклонус-синдром «танцующих глаз»

Изменения полей зрения при поражении хиазмы при рассеянном склерозе

- бitemпоральное сужение с центральными скотомами
- бitemпоральное сужение с бitemпоральными парацентральными скотомами
- бitemпоральное сужение с темпоральной скотомой на одном глазу
- бitemпоральные центральные скотомы без сужения границ
- бitemпоральное сужение без скотом

Изменения на глазном дне:

- бледность диска зрительного нерва, преимущественно с височной стороны
- экссудат в области физиологической экскавации дзн
- отёк макулы
- серозная отслойка пигментного эпителия

«Классические» неврологические синдромы:

- триада Шарко-нистагм, интенционное дрожание, мозжечковая дизартрия
- триада Марбурга-центральные парезы, отсутствие брюшных рефлексов, побледнение височных половин ДЗН
- триада Нонне-расстройства координации движений, гиперметрия, мозжечковая дизартрия

Спасибо за внимание!