

РязГМУ им. акад. И.П.Павлова  
Кафедра госпитальной хирургии

Лекция на тему:

# Травма живота

# Травма живота мирного времени

## Актуальность

- Ежегодно от травм в мире умирает около 5,5 млн человек
- В 2006 году более 30 млн человек поступили в отделения оказания экстренной помощи с травмами разной степени тяжести
- Это 1,5-2,5% всех травм вообще
- Летальность 7-45%
- Послеоперационные осложнения – 8-25%
- Трудоспособное население > 60 %

# Травма живота мирного времени

## Классификация

### Открытые повреждения (ранения)

- 1. Не проникающие в брюшную полость.
- 2. Проникающие без повреждения внутренних органов.
- 3. Проникающие с повреждением внутренних органов:
  - Полых
  - Паренхиматозных
  - Сосудов
- 7. Проникающие торакоабдоминальные и абдоминально-торакальные ранения:
  - а) без повреждения внутренних органов;
  - б) с повреждением внутренних органов.

# Травма живота мирного времени

## Классификация открытых травм

### По механизму:


- Колотые
- Резаные
- Колото-резаные
- Огнестрельные



# Травма живота мирного времени

## Классификация открытых травм

- По характеру:
  - Изолированные
  - Множественные
  - Сочетанные
  - Комбинированные



# Травма живота мирного времени

## Классификация

- Закрытая (тупая) травма

1. Ушиб брюшной стенки.
2. Повреждения полых органов.
3. Повреждения паренхиматозных органов.

- **Механизм закрытой травмы (прямой, не прямой):**

1. Контузия
2. Разрыв
3. Двухэтапный разрыв паренхиматозных органов

# Травма живота мирного времени

## Закрытая травма

- Причины:
  - Дорожно-транспортные происшествия
  - Бытовая травма
  - Кататравма (падение с высоты)
  - Удар в живот твердым предметом
  - Сдавление живота
  - Действие взрывной волны

# Травма живота мирного времени ДТП






# Травма живота мирного времени

## Падение с высоты



# Травма живота мирного времени

## Падение с высоты



# Диагностика травм живота

- Анамнез
- Жалобы
- Физикальное обследование
- Лабораторное исследование
- УЗИ брюшной полости (чувствительность 88 %, специфичность – 95%)
- Рентгенологические методы исследования (обзорная рентгенография, ангиография, вальнуерография)
- КТ (чувствительность более 90%, специфичность – 98%)
- МРТ
- Лапароцентез (диагностический перитонеальный лаваж - метод «шарящего» катетера Н.К.Голобородько)
- Диагностическая лапароскопия (видеолапароскопия)

# Шкалы оценки тяжести травмы

- **Общехирургические**

- APACHE II, III (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, Knaus et al. в 1981)
- SAPS I, II (A Simplified Acute Physiology Score, Le Gall, 1984)
- SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment score, Vincent, 1996)
- MODS (Multiple organ dysfunction score, Marshall et al., 1995)

- **Специальные для оценки пациентов с травмой**

- ISS (Injury Severity Score, Baker et al. в 1974)
- RTS (Revised Trauma Score, Champion et al., 1989)
- TRISS (RTS + ISS, Boyd et al., 1987) чувствительность при ЗТ 60%
- ASCOT, ICISS, NISS и другие



# Диагностика



Эвисцерация слепой кишки

# Диагностика



Огнестрельное ранение живота

# Клиническая картина

- Клиника перитонита
- Клиника внутрибрюшного кровотечения
- Клиника внутрибрюшного кровотечения с перитонитом

# УЗИ

- УЗИ – в ряде клиник заменяет лапароцентез и, зачастую, лапароскопию
- **УЗИ – в определении гемоперитонеума:**
  - чувствительность - 85% - 99%,
  - специфичность - 97% - 100%.

Kawaguchi et al., считают, что 70 мл - должны быть определены,

Tiling et al. полагают, что минимальным количеством являются 30 mL.

При этом при появлении анэхогенной полоски в пространстве Морисона - примерно 250 мл, при ширине от 0,5 до 1 см – 500 мл – 1 л.

- Подлежат обследованию 4 акустических окна: перикардальное, окологепаточное, околоселезеночное и малый таз в положении больного лежа на спине.



# Тактика лечения

- Клиника перитонита – экстренная операция
- Клиника продолжающегося внутреннего кровотечения – экстренная операция
- Стратегия NOT (non operative treatment) – консервативная терапия
- Стратегия ETC (early total care) - немедленной тотальной помощи
- Стратегия DCS (damage control surgery) - тактика этапного лечения повреждений и их контроля

# NOT

- Необходимые условия:
  - стабильная гемодинамика;
  - стабильные показатели гемоглобина и гематокрита;
  - отсутствие повреждений других анатомических областей, требующих оперативного лечения;
  - наличие медоборудования и персонала, обеспечивающего круглосуточное наблюдение.
- Применение малоинвазивных методов – пункции и дренирование под контролем УЗИ, КТ, рентгеноэндovasкулярные вмешательства, рентгеноэндобилиарные вмешательства

# ЕТС

- *Early total care* – одномоментное хирургическое лечение всех повреждений (полостных и ортопедических) в первые 24 часа после травмы
- Используется с 80-х годов XX века (Еске Н., 1985)
- Допустима в прогностически благоприятных случаях

# DCS

(Rotondo M. et al., 1993)

«Damage control surgery» - этапное лечение при тяжелых сочетанных травмах, предполагающее быстрое завершение оперативного вмешательства после остановки угрожающего жизни кровотечения и предотвращения инфицирования, последующую коррекцию нарушений основных видов обмена и систем с заключительным оперативным вмешательством.


## **Основные этапы:**

- 1) максимально быстрое оперативное пособие: остановка кровотечения, зачастую – временная; предотвращение загрязнения брюшной полости; временное закрытие брюшной полости;**
- 2) коррекция угрожающих жизни нарушений, в первую очередь – гипотермии, ацидоза, коагулопатии;**
- 3) окончательное оперативное вмешательство по мере стабилизации состояния больного (через 24-72 часа).**

# Основные показания к DCS

- Гипотензия (АД сис < 90 мм.рт.ст)
- Гипотермия (т-ра тела < 34°C)
- АЧТВ плазмы > 60 сек.
- рН < 7,2
- Повреждение крупных сосудов
- Наличие угрожающих жизни повреждений

# Травма печени



# Д и а УЗИ – повреждение печени при закрытой травме брюшной н о с т и к а п о в р е ж д е н н й п е

## Диагностика повреждений печени

УЗИ – повреждение печени при закрытой травме брюшной  
ПОЛОСТИ



- гиперэхогенный участок в паренхиме правой доли печени



# УЗИ



Свободная жидкость в пространстве Морисона

# КТ – закрытая травма живота разрыв печени



# КТ – массивная внутрипаренхиматозная гематома



# Шкала повреждений печени по E. Moore (пересмотр 1994)

Тяжесть	Описание	
I. Гематома	Субкапсулярная, <10% поверхности	45%
Рана	Разрыв капсулы, <1 см глубиной	
II. Гематома	Субкапсулярная, 10% - 50% поверхности; интрапаренхиматозная, <10 см в диаметре	36%
Рана	1–3 см глубина повреждения паренхимы, <10 см в длину	
III. Гематома	Субкапсулярная, >50% поверхности или растущая; разрыв 14% субкапсулярной или интрапаренхиматозной гематомы	
Рана	интрапаренхиматозная >10 см или растущая > 3 см глубиной	
IV. Рана	Повреждение паренхимы, с поражением 25–75% доли печени или 1–3 сегмента одной доли	
V. Рана	Повреждение паренхимы, с поражением >75% доли печени или > 3 сегментов одной доли	
Сосудистое повреждение	Юкстапеченочное повреждение вен (печеночная вена, нижняя полая вена)	
VI. Сосудистое повреждение	Отрыв печени	

# V. Степень тяжести повреждений



# Тактика лечения

## 1. Оперативное

- цель: адекватный гемостаз и желчестаз


## 2. NOM (Консервативная терапия)



# Физические способы гемостаза


- Ушивание печени (игла Пенского, швы Кузнецова, Замошина)
- Оментогепатопексия
- Моно- и биполярная коагуляция
- Лазерная коагуляция
- Аргоно-плазменная коагуляция
- Спрэй-коагуляция

# Ушивание разрывов печени





# Ушивание раны печени



# Прием Прингла



# Фармакологические способы гемостаза

- Растворы солей железа (феракрил, капрофер)
- Гемостатическая губка, сургицель
- Фибриновый клей (Тиссукол)
- Фибрин-коллагеновая пластина Тахокомб

## Основные тенденции в лечении повреждений печени в настоящее время

Прямые вмешательства при повреждении крупных вен

Применение методов наружного сдавления печени



Рентгеноэндоваскулярные вмешательства для остановки  
кровотечений

Временное порто-кавальное шунтирование

Консервативное (неоперативное) лечение



# Прямые вмешательства при повреждении крупных вен



- **Предсердно – кавальное шунтирование**

- Уровень летальности 50 – 90% при ранениях печени и до 100% при закрытой травме

**Heaney technique** - сосудистые зажимы на нижнюю полую вену и турникет на печеночно - двенадцатиперстную связку, временное порто-кавальное шунтирование

# Методы наружного сдавления


1. Гепатопексия (верхняя по Киари-Алферову, задняя по Шапкину)
2. Окутывание (mesh wrapping) сеткой из кетгута или викрила
3. Пакетирование (тампонирование)
4. Баллонирование (баллонное тампонирование)

эффективны для остановки  
паренхиматозного или венозного  
кровотечений,

– малоэффективны – при артериальном.

# Методы наружного сдавления

## Окутывание





# Тампони́рование печени (тактика damage control)



a




b






# Методы наружного сдавления. КТ- при тампонировании



# Баллонное тампонирование катетером Фоллея



# Ангиография



# Рентгенэндоваскулярные вмешательства для остановки кровотечений

- артериальное кровотечение
- центральные гематомы (нестабильные, нарастающие)
- гемобилия

# NOT - Консервативное лечение


- Лапаротомия для остановки кровотечения необходима в 5 – 15% травмы печени при закрытой травме живота, накоплен положительный опыт в педиатрии.
- Количество пропущенных сопутствующих повреждений кишечника 1 – 3%.
- Повреждения I – III стадии по E. Moore
- Необходимые условия:
  - стабильная гемодинамика;
  - стабильные показатели гемоглобина и гематокрита;
  - отсутствие повреждений других органов брюшной полости и забрюшинного пространства, требующих оперативного лечения;
  - наличие медоборудования и персонала, обеспечивающего круглосуточное наблюдение.
- Применение малоинвазивных методов – пункции и дренирование под контролем УЗИ, рентгеноэндоваскулярные вмешательства, рентгеноэндобилиарные вмешательства.

# Прогноз при травме печени

- 1-2 степень – летальность менее 1%
- 3-4 степень – 10 %
- 5-6 степень – более 75%
  
- Суммарно при 3-6 степени
  - при закрытой травме – летальность 27%
  - при открытой – 11%



# Травма селезенки





(Emil Theodor Kocher, конец XIX - начало XX века)

«Любое повреждение селезёнки  
обязательно должно быть  
закончено спленэктомией»

(Emil Theodor Kocher, конец XIX - начало XX века)

# Классификация травм селезенки

- 1 степень – глубина разрыва менее 1 см, субкапсулярная гематома менее 10% (32%)
- 2 степень – 1-3 см, субкапсулярная гематома 10-50%, менее 5 см в диаметре (24%)
- 3 степень – более 3 см, нарастающая гематома, размер более 5 см, разрыв гематомы (18%)
- 4 степень – разрыв сегментарных и воротных сосудов, прорыв гематомы, ишемия более 25% (15%)
- 5 степень – полное размозжение или отрыв (11%)


## 2 степень повреждения селезенки



КТ – разрыв селезенки, степень 3



# КТ-травма селезенки, степень 4






# Травма селезенки, степень 5





# Селективная ангиография



# Тактика лечения

## 1. Оперативное лечение

- Спленорафия (окутывание, тампонирование, физический и фармакологический гемостаз)
- Резекция
- Спленэктомия ( менее 30 %, у детей менее 10%)

## 2. Неоперативное (в т.ч. селективная эмболизация артерий селезенки).

Оценка характера повреждений

1-2 класс  
(небольшая  
субкапсу-  
лярная гематома,  
разрыв <3 см)

3 класс  
(нараст.гематома,прорыв,  
разрыв сегментарных  
сосудов)

5 класс  
полное размождение  
селезенки

стабильная

гемодинамика

нестабильная


СПЛЕНОРАФИЯ  
Оментопексия  
Тахокомб

Резекция селезёнки

Спленэктомия




АУТОСПЛЕНОИМПЛАНТАЦИЯ

# Спленорафия






# Этапы резекции селезенки



# Этапы спленэктомии

## EMERGENCY SPLENECTOMY





# Профилактика постспленэктомической инфекции


- Частота ПСЭИ – 0,5% (летальность 60-80%)
- Аутоспленоимплантация
- Антибиотикотерапия
- Вакцинация

# Аутоспленоимплантация

## TRANSPLANTING THE SPLEEN

**B**

making a pocket  
in the parietal  
peritoneum




**A**

slicing the spleen



**C**

the slices in place



# Доказано

- Ткань приживляется
- Сохраняется функция гемопоэза
- Сохраняется функция РЭС
- Степень защиты от инфекции изучается

# Вакцинация

Оптимально – за 3 недели до спленэктомии  
(плановая хирургия селезенки)

Против:

- Пневмококка (в ближайшие 2 недели после операции, ревакцинация через 5 лет)
- Гемофильной палочки (однократно)
- Менингококка (однократно)
- Вирус гриппа (ежегодная ревакцинация)

# Реинфузия

- Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2002 г. N 363 "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови"
- - потеря более 20% ОЦК
- - пробы на гемолиз и бактериальное загрязнение
- - аппараты для реинфузии - Cell-saver.



# Особенности повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота

- Относительно редко встречается, на 10-ом месте (наиболее часто – черепно – мозговая травма, селезенка, печень).
- Из 100 поступивших с травмой живота – у 5-10 %
- Как правило, сочетается с повреждением печени, селезенки
- Дилемма в лечении повреждений поджелудочной железы
  - «малые» повреждения сложно диагностировать, относительно легко – лечить;
  - «большие» повреждения – легко диагностировать, но сложно лечить, при этом для пациента – потенциально гибельная ситуация


# УЗИ – контузия поджелудочной железы при закрытой травме живота




- анэхогенная «полоска» над железой – перипанкреатическая жидкость
- неровные, местами «размытые» контуры
- расширение основного протока железы

# Диагностика повреждений ПЖ

## ЭРХПГ



## КТ при повреждении поджелудочной железы при закрытой травме живота



**а – разрыв в области хвоста**

**б – разрыв в области перешейка**

# Шкала степени тяжести повреждения поджелудочной железы и лечебная тактика

Степень	Описание
I	Незначительная контузия или разрыв без повреждения протока <u>Лечение:</u> только наблюдение, NOT
II	Значительная контузия или разрыв без повреждения протока <u>Лечение:</u> удаление нежизнеспособных тканей, дренирование, возможно - восстановление
III	Дистальное пересечение (разрыв) или повреждение с повреждением основного протока <u>Лечение:</u> дистальная резекция, возможно - панкреатоеюностомия
IV- V	Проксимальное пересечение (разрыв) с вовлечением ампулы, массивное повреждение головки железы <u>Лечение:</u> «Damage control», остановка кровотечения, дренирование, ПДР вторым этапом



Состояние основного протока и локализация повреждения – определяют и тактику, и результаты лечения.

- Проксимальное повреждение – правее мезентериальных сосудов,
  - лечение – дренирование;
- Дистальное повреждение – левее мезентериальных сосудов,
  - без повреждения основного протока – дренирование,
  - при повреждении протока – дистальная резекция с дренированием.


Частота развития свищей – до 15%, закрываются – в течение 3 месяцев.

(Patton [JH](#)(Patton JH [Jr](#) et al. Pancreatic trauma: a simplified management guideline. J Trauma. 1997 Aug;43(2):234-9; discussion 239-41.)

# Повреждение брыжейки кишечника

- а) лапаротомия;
- б) гемостаз;
- в) оценить возможность реинфузии;
- г) оценить жизнеспособность кишки  
(определить в зависимости от состояния  
кишки в зоне травмы).

# Разрыв брыжейки тонкой кишки




# Повреждение полых органов

- а) лапаротомия;
- б) при кровотечении гемостаз;
- в) в зависимости от объема кровопотери оценить возможность и необходимость реинфузии крови;
- г) оценить объем травмы кишечника и в зависимости от неё определить объем операции;
- д) в зависимости от давности травмы и наличия перитонита решить вопрос об объёме операции (ушивание раны, резекция сегмента кишки с наложением анастомоза или стомы);
- е) санация брюшной полости, программированная санация, дренирование;
- ж) профилактика и лечение послеоперационных осложнений (антибиотикотерапия, стимуляция перистальтики, ранняя активация и т. д.).



# КТ-диагностика



Свободная жидкость,  
отсутствие повреждения паренхиматозных органов



# Огнестрельное ранение живота с повреждением кишечника



# Ранение тонкой кишки



Спасибо за внимание!

