


# ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

*два любых тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними*  
 (И. Ньютон – 1667 г.)




$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}$$

Применим для:

- материальных точек,
- шаров,
- шара большого  $R$  и тела

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{кг}^2}$$

гравитационная постоянная



$$F_{\text{тяж}} = mg$$

$$F_{\text{тяж}} = G \frac{M_3 m}{R_3^2}$$

$$g = G \frac{M_3}{R_3^2}$$


$$g_h = G \frac{M_3}{(R_3+h)^2}$$




$$g_s \approx 9,78 \text{ м/с}^2$$

$$g_n \approx 9,83 \text{ м/с}^2$$

$$(R_s > R_n)$$



# ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ (ИСЗ)



По второму закону Ньютона:  $ma = F_{\text{тяж}}$

$$\text{т.к. } a = \frac{v^2}{R_3 + h} \quad F_{\text{тяж}} = G \frac{M_3 m}{(R_3 + h)^2}$$

$$\frac{mv^2}{R_3 + h} = G \frac{M_3 m}{(R_3 + h)^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM_3}{R_3 + h}}$$

$$\text{Если } h \rightarrow 0, \text{ то } v = \sqrt{\frac{GM_3}{R_3}}$$

$$v_1 \approx 8 \text{ км/с}$$

**Первая космическая скорость** (круговая) – скорость, которую необходимо сообщить телу у поверхности планеты, чтобы оно стало ее спутником, движущимся по круговой орбите.

**Вторая космическая скорость** (11,2 км/с) – тело преодолевает притяжение Земли и уходит в космическое пространство.

1

Какие из представленных систем отсчёта можно считать инерциальными?  
(Баллов: 1)

- Система отсчёта связанная с автобусом движущимся равномерно и прямолинейно относительно земли. ✓
- Система отсчета связанная с автомобилем, движущемся равномерно по выпуклому мосту.
- Система отсчета связанная с поездом, равноускоренно отходящим от станции.
- Система отсчета связанная со свободно падающим телом.

9

Тело массой 200 г скользит по шероховатой поверхности. Определите сколько времени пройдет до остановки тела, если его начальная скорость 20 м/с, а модуль действующей силы трения 0,5 Н. Ответ дайте в секундах. Вводим только число.

(Баллов: 1)

Введите ответ

Правильные ответы: 8

10

Шайба скользящая по гладкой горизонтальной поверхности, попадает на шероховатый участок длиной 50 см. Скорость шайбы при прохождении участка уменьшается в 2 раза. Определите начальную скорость шайбы, если сила трения действующая на нее на данном участке 0,8 Н, а ее масса 200 г. Ответ дать в м/с, предварительно округлив до десятых долей. Вводим только число.

(Баллов: 1)

Введите ответ

Правильные ответы: 2,3;2,3

Определите ускорение свободного падения на Луне, если масса Луны  $7,3 \cdot 10^{22}$  кг. Радиус Луны принять равным 1700 км.

$$1,6 \text{ м/с}^2$$

На каком расстоянии от поверхности Земли ускорение свободного падения равно  $1 \text{ м/с}^2$ ?

$$13600 \text{ км}$$

Найти массу и среднюю плотность Земли. Радиус Земли принять равным 6400 км.

$$6 \cdot 10^{24} \text{ кг}, 5,5 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$$

Определите ускорение свободного падения на высоте, равной радиусу Земли.

$$2,4 \text{ м/с}^2$$