

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Молекулярная физика — раздел физики, который изучает физические свойства тел на основе рассмотрения их молекулярного строения.

Молекулярная физика *основана на молекулярно-кинетической теории*, согласно которой строение и свойства тел объясняются хаотичным движением и взаимодействием молекул, атомов и ионов (т.е. частиц).

Основными положениями молекулярно-кинетической теории являются:

- 1. Любое вещество состоит из частиц молекул и атомов, а те из более маленьких частиц;
- 2. Молекулы, атомы и другие частицы находятся в непрерывном хаотичном движении;
- 3. Между частицами имеется сила притяжения и сила отталкивания.

Молекулярной физикой рассматриваются: строение газов, твёрдых тел и жидкостей, их изменение под внешним воздействием (давления, температуры, магнитного и электрического полей), явления переноса (внутреннее трение, теплопроводность, диффузия), процессы фазовых переходов (испарение и конденсация, кристаллизация и плавление и т.п.), фазовое равновесие, критическое состояние веществ.

Физические свойства веществ:

- 1) агрегатное состояние (твердое тело, газ, жидкость);
- 2) запах;
- 3) цвет;
- 4) плотность;
- 5) растворимость;
- 6) электро- и теплопроводность;
- 7) температура плавления и кипения.

Состав веществ


Любые вещества состоят из атомов, молекул и ионов.

Атом представляет собой мельчайшую частицу вещества, состоящую из заряженного положительно ядра и заряженной отрицательно электронной оболочки.

Положительный заряд несет протон.

Также в состав ядра входят нейтральные элементарные частицы – нейтроны.

Единица отрицательного заряда – электрон.



- **Относительная атомная масса вещества** это отношение массы молекулы (или атома) данного вещества к 1/12 массы атома углерода.
- **Количество вещества** это число молекул (атомов) в теле. 1 моль = количеству вещества, в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько содержится в углероде массой 0,012 кг. Это постоянная величина, называемая *постоянной Авогадро* (N_A = $6*10^{23}$ моль⁻¹).
- Беспорядочное (хаотическое) движение микрочастиц, из которых состоят все тела, носит название **теплового движения**.
- **Тепловое равновесие** это такое состояние системы тел, находящихся в тепловом контакте, при котором не происходит теплопередачи от одного тела к другому, и все макроскопические параметры тел остаются неизменными.
- **Температура** это физический величина, характеризующая тепловое состояние тел. Она одинаковая для всех тел, находящихся в тепловом равновесии.

ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР

Шкала Кельвина

В термодинамике используется шкала Кельвина, в которой температура отсчитывается от абсолютного нуля (состояние, соответствующее минимальной теоретически возможной внутренней энергии тела), а один кельвин равен 1/273. Расстояния от абсолютного нуля до тройной точки воды (состояния, при котором лёд, вода и водяной пар находятся в равновесии). Для пересчета кельвинов в энергетические единицы служит постоянная Больцмана. Используются также производные единицы: килокельвин, мегакельвин, милликельвин и т.д. $T=t^0C+273$; t=T-273

Шкала Цельсия

В быту используется шкала Цельсия, в которой за 0 принимают точку замерзания воды, а за 100° точку кипения воды при атмосферном давлении. Поскольку температура замерзания и кипения воды недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен кельвину, абсолютный ноль принимается за –273,15 °C.

Шкала Фаренгейта

В Англии и, в особенности, в США используется шкала Фаренгейта. Предложена Г. Фаренгейтом в 1724. В этой шкале на 100 градусов раздёлен интервал от температуры самой холодной зимы в городе, где жил Фаренгейт, до температуры человеческого тела. Ноль градусов Цельсия — это 32 градуса Фаренгейта, а градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия. $t_{\text{тела человека}}^{-960}$

Шкала Реомюра

- Предложенна в 1730 году Р. А. Реомюром, который описал изобретённый им спиртовой термометр . 1 °R = 1,25 °C.
- В настоящее время шкала вышла из употребления, дольше всего она сохранялась во Франции, на родине автора.

«РАЗВИТИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МКТ»

- Подтверждением основных положений молекулярно-кинетической теории являются: диффузия, броуновское движение и изменение агрегатных состояний веществ.
- 1.В процессе движения молекулы и атомы одного вещества проникают между молекулами и атомами другого вещества, соприкасающегося с ним. Точно так же ведут себя молекулы и атомы второго вещества по отношению к первому. И через некоторое время молекулы обоих веществ равномерно распределяются по всему объёму.
- 2. Процесс проникновения молекул одного вещества между молекул другого называется диффузией. С явлением диффузии мы сталкиваемся дома каждый день, когда опускаем пакетик чая в стакан с кипятком. Мы наблюдаем, как бесцветный кипяток меняет свой цвет. Бросив в пробирку с водой несколько кристалликов марганца, можно увидеть, что вода окрасится в розовый цвет. Это также диффузия.
- 3. Число частиц в единице объёма называют концентрацией вещества. При диффузии молекулы перемещаются из тех частей вещества, где концентрация выше, в те части, где она меньше. Перемещение молекул называют диффузионным потоком. В результате диффузии концентрации в различных частях веществ выравниваются.

Диффузия

Диффузию можно наблюдать в газах, жидкостях и твёрдых телах. В газах она происходит с большей скоростью, чем в жидкостях. Быстрее распространяются запахи в воздухе.

Скорость диффузии зависит от площади поперечного сечения потока, разности концентраций веществ, разности их температур или зарядов. Через стержень диаметром в 2 см тепло распространяется в 4 раза быстрее, чем через стержень диаметром в 1 см. Чем выше разность температур веществ, тем выше скорость диффузии. При тепловой диффузии её скорость зависит от теплопроводности материала, а в случае потока электрических зарядов — от электропроводности.

«ПЕРВОЕ УРАВНЕНИЕ ФИКА»

В 1855 г. немецкий физиолог Адольф Евгений Фик сделал первое количественное описание процессов диффузии:

$$J = -D\frac{\partial C}{\partial x}$$

«-»-показыват что диффузия происходит из области с большей концентрацией в область меньших концентраций (т.е против градиента концентраций).

Где J - плотность диффузионного потока вещества (моль/м 2 с),

D - коэффициент диффузии(M^2/c),

 ${\it C}$ - концентрация вещества, х-толщина мембраны.

Диффузия, в результате которой концентрации веществ выравниваются, называется *нестационарной диффузией*. При такой диффузии градиент концентрации изменяется со временем. А в случае *стационарной диффузии* этот градиент остаётся постоянным.

«БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

- Открыл это явление шотландский ботаник Роберт Броун в 1827 г. Изучая под микроскопом взвешенные в воде цитоплазматические зёрна, выделенные из клеток пыльцы североамериканского растения Clarkia pulchella, он обратил внимание на мельчайшие твёрдые крупинки.
- <u>Броуновским движением</u> называется беспорядочное движение частиц, вызванное тепловым движением молекул или атомов. Броуновская частица непрерывно подвергается ударам со стороны молекул и атомов, из которых состоят жидкости и газы. И это движение не прекращается.
- В броуновском движении могут *участвовать частицы размером до 5 мкм* (микрометров). Если их размер больше, они неподвижны. Чем меньше размер броуновской частицы, тем быстрее она движется. Частицы менее 3 мкм двигаются поступательно по всем сложным траекториям или вращаются.
- Сам Броун не смог объяснить открытое им явление. И лишь в XIX веке учёные нашли ответ на этот вопрос: движение броуновских частиц вызвано воздействием на них теплового движения молекул и атомов.

ТРИ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

Три состояния: твёрдое, жидкое или газообразное. Они называются агрегатными.

- **В газах расстояние между молекулами велико**. Поэтому силы притяжения между ними настолько слабы, что они совершают хаотическое и практически свободное движение в пространстве. Направление своего движения они меняют, ударяясь друг о друга или о стенки сосудов.
- **В жидкостях молекулы расположены ближе одна к другой, чем в газе.** Силы притяжения между ними больше. Молекулы в них движутся уже не свободно, а хаотично колеблются возле положения равновесия. Но они способны перескакивать в направлении действия внешней силы, меняясь местами друг с другом. Результатом этого является течение жидкости.
- В твёрдых телах силы взаимодействия между молекулами очень велики из-за близкого расстояния между ними. Притяжение соседних молекул они преодолеть не могут, поэтому способны совершать только колебательные движения около фиксированных центров (положений равновесия). Эти центры могут быть расположены в пространстве нерегулярным образом (аморфные тела) или образовывать упорядоченные объемные структуры (кристаллические тела).
- Твёрдые тела *сохраняют объём и форму*. Жидкость *формы не имеет*, она всегда принимает форму сосуда, в котором находится в данный момент. Но её объём при этом сохраняется. *По-другому ведут себя газообразные тела*. Они *легко меняют и форму, и объём*, принимая форму того сосуда, в который их поместили, и занимая весь предоставленный им объём.
- Однако существуют и такие тела, которые имеют структуру жидкости, обладают небольшой текучестью, но при этом способны сохранять форму. Такие тела называют аморфными.
- Современная физика выделяет и четвёртое агрегатное состояние вещества *плазму* (частично или полностью ионизованный газ, образованный из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов)).

Вещество может находиться в различных физических состояниях или фазах.

- Фаза физически однородная часть вещества, отделенная от остальных частей системы границей раздела (лед, вода, пар).
- Вещество может находиться в трех агрегатных состояниях жидком, твердом газообразном. Но понятия фазы вещества и его агрегатного состояния не являются тождественными. В пределах одного и того же агрегатного состояния вещество может находиться в различных фазах. Например: алмаз и графит.
- В окружающей нас среде мы часто наблюдаем фазовый переход вещества, например воды, из жидкого состояния в газообразное, т.е. в пар.
- Фазовый переход переход из одной фазы в другую, из одного агрегатного состояния в другое.

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ

Газовое состояние — одно из тех состояний вещества, описание которого на основе методов молекулярно-кинетической теории уже с самого начала ее развития дало наиболее полные и ощутимые результаты.

Идеальный газ — математическая модель газа, в которой предполагается, что потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению сих кинетической энергией.

Изопроцессы идеального газа – процессы, при которых один из параметров остаётся неизменным.

1. Изохорический процесс. Закон Шарля. V = const.

Изохорическим процессом называется процесс, протекающий при постоянном объёме V. Поведение газа при этом изохорическом процессе подчиняется закону Шарля: *При постоянном объёме и неизменных значениях массы газа и его молярной массы, отношение давления газа к его абсолютной температуре остаётся постоянным: P/T = const.*

График изохорического процесса на диаграмме называется изохорой.

2. Изобарический процесс. Закон Гей-Люссака. P = const.

Изобарическим процессом называется процесс, протекающий при постоянном давлении **P**. Поведение газа при изобарическом процессе подчиняется закону Гей-Люссака: **При постоянном давлении и неизменных значениях массы и газа и его молярной массы, отношение объёма газа к его абсолютной температуре остаётся постоянным: V/T = const.**

График изобарического процесса на диаграмме называется изобарой.

3. Изотермический процесс. Закон Бойля – Мариотта. Т = const.

Изотермическим процессом называется процесс, протекающий при постоянной температуре Т. Поведение идеального газа при изотермическом процессе подчиняется закону Бойля — Мариотта: При постоянной температуре и неизменных значениях массы газа и его молярной массы, произведение объёма газа на его давление остаётся постоянным: PV = const.

График изотермического процесса на диаграмме называется изотермой.

4. Уравнение Менделеева-Клапейрона.

Газы нередко бывают реагентами и продуктами в химических реакциях. Не всегда удается заставить их реагировать между собой при нормальных условиях. Поэтому нужно научиться определять число молей газов в условиях, отличных от нормальных.

Для этого используют уравнение состояния идеального газа (его также называют уравнением Клапейрона-Менделеева):

PV = nRT

где п – число молей газа;

Р – давление газа (например, в атм);

V – объем газа (в литрах);

Т – температура газа (в кельвинах);

R – газовая постоянная (0,0821 л·атм/моль·К).

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Термодинамика – раздел физики, рассматривающий явления, связанные с взаимопревращением механической и внутренней энергий и передачей внутренней энергии от одного тела к другому.

Термодинамической системой называется совокупность тел, выделенная для рассмотрения вопросов термодинамики.

Изменение внутренней энергии AU может быть осуществлено двумя способами:

- путем совершения над телом работы: сжатие, растяжение тела; работа механизмов: пилы, дрели;
- путем сообщения телу теплоты, то есть через теплопередачу: нагревание в закрытом сосуде, нагревание жидкости.

Теплопередачей называется процесс перехода внутренней энергии от одного тела к другому без совершения над телом работы.

Виды теплопередачи:

- конвекция;
- теплопроводность;
- лучеиспускание
- **Конвекция** процесс передачи количества теплоты путем перемешивания холодных и теплых слоев жидкости или газа (центральное водяное отопление, ветры, морские течения, тяга в трубах, нагревание жидкости снизу сосуда).
- **Теплопроводность** процесс передачи количества теплоты от более нагретой части тела к менее нагретой без перемещения частиц (металлы хорошие проводники тепла; дерево, стекло, кожа плохие; газы менее теплопроводны, чем жидкость => плохая теплопроводность.
- **Лучеиспускание** теплопередача через излучение с помощью электромагнитных волн (энергия, получаемая Землей от Солнца).
- **Работа.** В термодинамике определяется так же, как и в механике, но равна изменению <u>не кинетической энергии, а его внутренней энергии</u>.
- **Количество теплоты** AQ количество энергии, переданной от тела телу в результате теплопередачи (без совершения работы).

ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ.

• Первый закон термодинамики является обобщением закона сохранения и превращения энергии для термодинамической системы. Изменение ДU внутренней энергии неизолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты Q, переданной системе, и работой А, совершенной системой над внешними телами.

$$Q = \Delta U + A$$

ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

Существует два классических определения второго закона термодинамики:

1. Кельвина и Планка

Не существует циклического процесса, который извлекает количество теплоты из резервуара при определенной температуре и полностью превращает эту теплоту в работу. (Невозможно построить периодически действующую машину, которая не производит ничего другого, кроме поднятия груза и охлаждения резервуара теплоты)

2. Клаузиуса

Не существует процесса, единственным результатом которого является передача количества теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. (Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет охлаждения теплового резервуара)

• Оба определения второго закона термодинамики опираются на первый закон термодинамики, утверждающий, что энергия убывает.

ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

- Энтропия функция, состояния термодинамической системы, определяющая меру необратимого рассеивания энергии.
- Для того, чтобы энергию можно было использовать, в системе должны быть области с высоким и низким уровнями энергии. Полезная работа производится в результате передачи энергии от области с высоким уровнем энергии к области с низким уровнем энергии.

При этом важно понимать, что:

- 100% энергии не может быть преобразовано в работу
- Энтропия может вырабатываться, но не может быть уничтожена
- Если теплота беспорядочное колебательное движение молекул, то при охлаждении энтропия системы должна уменьшаться. *Когда же тепловое движение полностью прекратится, система будет при абсолютном нуле температуры*. Естественно предположить, что при такой температуре энтропия равна нулю.
- Энтальпия это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении.

ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

• При абсолютном нуле температуры любые изменения термодинамической системы происходят без изменения энтропии:

$$\Delta S_{T=0} = const; S_{T=0} = const; \Delta S_{T=0} = 0$$

Нернст установил, что вблизи абсолютного нуля температуры значение всех теплоемкостей становится равным нулю и энтропии S всех веществ, находящихся в равновесном состоянии, становятся неизменными и равными между собой. Из вышеуказанного рассуждения следует, что ни путем отвода тепла (т. е. охлаждением тела), ни путем совершения какой-либо работы вблизи абсолютного нуля понизить температуру тела невозможно.