



Возраст веретеницы ломкой (*Anguis fragilis*) определяют по наличию полос. С возрастом полоски исчезают, и постепенно самцы и самки приобретают обычный для них рисунок.

Веретеница ломкая - Европа



Желтопузик – Евразия: Балканы, Кавказ, Крым,
Передняя и Средняя Азия



Бородатая агама - Австралия



Агама колонистов

Описание этой великолепной ящерицы оставил немецкий зоолог Рейхенев, наблюдавший ее в Западной Африке более полувека назад. «На Золотом Берегу,— пишет этот исследователь,— агамы колонистов живут повсеместно во всех делениях. Всюду видишь их здесь на глиняных стенах хижин, на соломенных крышах, па белых степах, окружающих постройки европейцев, и около них. Они то спокойно лежат, с удовольствием подставляя себя вертикальным лучам жгучего солнца, то проворно бегают взад и вперед в погоне за насекомыми. Своеобразны движения этих животных, когда к ним приближается человек... Встревоженные агамы начинают усиленно двигать головой вверх и вниз, причем одновременно приподнимают и опускают на передних ногах всю переднюю часть тела... чем ближе подходишь к ним, тем быстрее становятся их движения, и вдруг животное с быстротой молнии исчезает в щелях стены или в соломе крыши».

В настоящее время область распространения этой ящерицы в Западной Африке непрерывно расширяется, поскольку они вместе с человеком проникает на обширные плантации тропических культур, возводимые па месте уничтоженных девственных лесов.

Maxim Ryzhov / 2017
herpeto-volga.ru



Степная агама Средняя Азия, Предкавказье. Обитает в песчаных, глинистых и каменистых пустынях и полупустынях, предпочитая места с [кустарниковой](#) или полудревесной растительностью. Встречается также на пологих каменистых склонах в [предгорьях](#) (в [Копетдаге](#) известна до высоты 1200 м над уровнем моря), по окраинам слабо закреплённых песков, по берегам рек и в [тугайных лесах](#), часто в непосредственной близости от воды, вблизи населённых пунктов и по обочинам дорог. В азиатской части ареала степная агама принадлежит к числу наиболее обычных ящериц степей и пустынь, её средняя численность составляет около 10 особей/га, весной в колониях [песчанок](#) до 60.



Щитохвостая агама. Пустыни северо-востока Африки.
Меликие размеры (до 9 см, до 20 граммов).



Ушастая
круглоголовка. Пустыни,
полупустыни Прекавказья,
Средней Азии





Плащеносная агама. Австралия, Новая Гвинея.
Сухие леса, лесостепи



Водяная агама. Индокитай. Широко распространенные в Азии, водяные агамы чаще встречаются у берегов рек и озер. Они активные в дневное время и проводят большое количество времени на ветках деревьев и кустов. В случае опасности они прыгают с них в воду и погружаются.



Акантозавр зелёный. Юго-Восточная Азия. Любит дождевые тропические леса в горах. Активен днём. Питается беспозвоночными.



Василиск шлемоносный – Южная Америка



Хамелеон йеменский – Передняя Азия