



Крaпивa
двудомная (*Urtica
dioica*)

Выполнила: Казымова Разия
Группа: 5304-ок

ПЛАН:

- Ботаническое описание
- Ареал, место произрастания
- Сбор и заготовка крапивы
- Химический состав
- Применение
- Фармакологические свойства
- Препараты
- Литература



Ботаническое описание


растение семейства крапивных (Urticaceae) высотой см. Стебли и листья покрыты волосками с едкой ядовитой жидкостью. Цветки крапивы однополые собраны в верхней части стебля пучками. Плод яйцевидный или эллиптический орешек (семянка) желтовато желтовато-серого цвета, 1,2-1,5 мм длиной.



Ареал, место произрастания

оврагам, по обочинам дорог, между кустарниками, на пустырях, вырубках, гарях, на опушках, в тенистых лесах, близ жилья, в садах. Наибольшие заросли образует в ольшаниках, на пустырях, около заброшенных поселений, вблизи жилья, вдоль дорог. Наибольшая плотность зарослей крапивы бывает там, где почвы богаты перегноем и достаточно увлажнены.

Ареал: Россия - средняя полоса Европейской части, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Кавказ, Средняя Азия.



Сбор и заготовка крапивы

В лечебных целях листья крапивы собирают в период цветения — **в июне-июле**. Заготовку травы и листьев производят аккуратно, лучше в перчатках, и сушат на открытом воздухе в тени (на чердаках или под навесами). Следует помнить о том, что сушеная крапива теряет некоторые полезные вещества.


Собранные части растения можно также заморозить или законсервировать. Для этого только что собранные листья моют, мелко нарезают, складывают в подготовленную емкость и ставят в морозильную камеру.

Химический состав



В листьях крапивы содержатся каротиноиды (β -каротин, виолаксантин,); витамины С, К, В1, В2; дубильные вещества (3,2 %); хлорофилл (до 5 %); гликозид уртицин, флавоноиды (1,96 %): органические кислоты (муравьиная, фумаровая, молочная, янтарная, лимонная, хинная); фенолкарбоновые кислоты (кофейная, кумаровая, феруловая); крахмал (до 10 %); алкалоиды (0,010—0,29 %): никотин, гистамин, ацетилхолин, 5-гидрокситриптамин; макро- и микроэлементы.

Применение



Крапиву применяют для лечения фурункулов, угрей, а также как средство от ревматизма и подагры. Как поливитаминное средство, она входит в состав многих желудочных, почечных, противоанемических и кровоостанавливающих сборов.

Фармакологические свойства

кровоостанавливающее действие, повышает тонус матки, нормализует овариально-менструальный цикл, уменьшает кровопотери при менометроррагиях, ускоряет свертывание крови, повышает содержание гемоглобина, тромбоцитов и эритроцитов в периферической крови. Кроме того, у растения есть и другие лечебные свойства. Лекарственные формы крапивы обладают сосудосуживающим, желчегонным, витаминизирующим, мочегонным и противовоспалительным свойствами, повышают процессы регенерации слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.



Препараты

Крапивы двудомной листья (Urticae folia).

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач.

Побочное действие

Редко: аллергические реакции.

При применении препаратов корня крапивы редко - слабовыраженные нежелательные явления со стороны ЖКТ.

В составе комбинированной терапии: инфекции мочевого тракта, мочекаменная болезнь, ревматизм, кровотечения, атеросклероз, железодефицитная анемия, симптоматическое лечение при увеличении предстательной железы.



КРАПИВА П

Оказывает кровоостанавливающее,

желчегонное, мочегонное действие;

Снижает уровень холестерина;

обладает противовоспалительными

свойствами;

регулирует нарушения углеводного

обмена.

БАД. Не является лекарственным средством.

Состав препарата «Крапива П» (205 мг):
крапива двудомная (криопорошок) – 70 мг,
витамин С – 10 мг.



Литература

- 1 Яковлев Г.П., Блинова К.Ф..
Лекарственное растительное сырье.
Фармакогнозия. СПб.: СпецЛит, 2004.
- 2 Соколов С.Я. Фитотерапия и
фитофармакология: Руководство для
врачей. М.: Медицинское информационное
агентство, 2000, 976 с.
- 3 Мазнев Н.И. Энциклопедия
лекарственных растений. 3-е изд., испр. и
доп. - М.: Мартин, 2004. - с. 231.