

Экзогенно-обусловленные формы олигофрении. Причины, клиническая картина

Подготовила:
студентка 2 курса
Морозова Елена

Эмиль Крепелин
(15.02.1856-07.10.1926)

Термин
«олигофрения»
был впервые
введен
психиатром
Эмилем
Крепелином.



Олигофрения- врождённая или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации.



Степени олигофрении

Лёгкая

Умеренная

Глубокая

Тяжелая



Формы олигофрении, связанные с внутриутробным поражением:

- Рубеолярная олигофрения (эмбриопатия);
- Олигофрения при врожденном сифилисе;
- Олигофрения, обусловленная токсоплазмозом;


Рубеолярная олигофрения (эмбриопатия)

патология эмбриона,
возникающая между 16-м и
75-м днем беременности,
индуцированная
воздействием повреждающих
факторов.



Олигофрения при врожденном сифилисе

Сифилис (устар.: **люэс**) — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum*.



Олигофрения, обусловленная токсоплазмозом


Токсоплазма (лат. *Toxoplasma*) —
монотипный
род паразитических протистов,
включающий, видимо, один
вид — *Toxoplasma gondii*. Основные
хозяева токсоплазм — представители
семейства кошачьих.

Формы олигофрении, связанные с перинатальной патологией:

- ✓ **Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью новорожденных;**
- ✓ **Олигофрения, обусловленная патологией родов (асфиксия, родовая травма);**
- ✓ **Олигофрения, обусловленная постнатальными факторами;**
- ✓ **Олигофрения, обусловленная листериозом – возникает как результат перенесенного внутриутробного менингоэнцефалита этого вида.**

Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью новорожденных

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) - заболевание, обусловленное несовместимостью крови матери и плода по различным антигенам, имеющимся в крови у последнего (наследуется от отца) и отсутствующим в крови матери.



Олигофрения, обусловленная патологией родов (асфиксия, родовая травма)

Возникает вследствие
церебральной
гипоксии или
внутричерепных
кровоизлияний



Олигофрения, обусловленная постнатальными факторами

В роли патогенного фактора выступают нейровирусные инфекции, черепно-мозговые травмы, интоксикации, перенесенные впервые 3 года жизни



Выраженный
интеллектуальный
дефект в сочетании с
психоорганическими
расстройствами.



Спасибо за внимание!

