

A dramatic photograph of a volcanic eruption. A bright, glowing fireball of orange and yellow light bursts from the summit of a dark, conical volcano. Below the fireball, thick, glowing lava flows cascade down the slopes of the mountain, appearing as bright orange and red streaks against the dark rock. The sky is a pale, hazy blue, providing a stark contrast to the intense fire.

Вулканы по видам

презентация

©Дамир Кадыров

Щитовидные (щитовые) вулканы

- Образуются в результате многократных выбросов жидкой лавы. Эта форма характерна для вулканов, извергающих базальтовую лаву низкой вязкости: она длительное время вытекает как из центрального жерла, так и из боковых кратеров вулкана. Лава равномерно растекается на многие километры; постепенно из этих наслоений формируется широкий «щит» с пологими краями. Пример — вулкан Мауна-Лоа на Гавайях, где лава стекает прямо в океан; его высота от подножия на дне океана составляет примерно десять километров (при этом подводное основание вулкана имеет длину 120 км и ширину 50 км).



Шлаковые конусы

- При извержении таких вулканов крупные фрагменты пористых шлаков нагромождаются вокруг кратера слоями в форме конуса, а мелкие фрагменты формируют у подножия покатые склоны; с каждым извержением вулкан становится всё выше. Это самый распространённый тип вулканов на суше. В высоту они не больше нескольких сотен метров. Часто шлаковые конусы формируются как побочные конусы крупного вулкана, либо в качестве отдельных центров эруптивной активности при трещинных извержениях. Пример — несколько групп шлаковых конусов появились при последних извержениях вулкана Плоский Толбачик на Камчатке в 1975-76 и в 2012-2013 гг.

Стратовулканы, или «слоистые вулканы»

- Периодически извергают лаву (вязкую и густую, быстро застывающую) и пирокластическое вещество — смесь горячего газа, пепла и раскалённых камней; в результате отложения на их конусе (остром, с вогнутыми склонами) чередуются. Лава таких вулканов вытекает также из трещин, застывая на склонах в виде ребристых коридоров, которые служат опорой вулкана.
Примеры — Этна, Везувий, Фудзияма.

Купольные вулканы

- Образуются, когда вязкая гранитная магма, поднимаясь из недр вулкана, не может стечь по склонам и застывает вверху, образуя купол. Она закупоривает его жерло, как пробка, которую со временем вышибают накопившиеся под куполом газы. Такой купол формируется сейчас над кратером вулкана Сент-Хеленс на северо-западе США, образовавшегося при извержении 1980 г.

A wide-angle landscape photograph showing a multi-lane highway curving through a green valley. In the background, a large, rounded mountain rises against a grey, overcast sky. A small town or village is visible at the base of the mountain. The text "Пасеба за внимание" is overlaid in the center of the image.

Пасеба за внимание