


Таджикистан

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ



Причины роста числа фактов бесплодия в Республике Таджикистан связано с неблагоприятными санитарными условиями, заболеваниями, передающимися половым путем, ухудшением гормонального обмена в организме, психическими нагрузками и плохим социальным положением, последствия трудовой миграции и болезни, связанные с миграцией, например переохлаждение организма

За годы независимости численность населения Таджикистана выросла с 5,5 миллионов до 8,65 миллионов человек в середине 2016 года.



Диагностика бесплодия:

- Анализ крови
- Мочи
- Гормонов
- Спермограмма
- УЗИ предстательной железы и мочеполовой системы

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ

1. Медикаментозные
2. Эндоскопические
3. Методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
 - При отсутствии положительного эффекта от проводимого традиционным способом лечения (не более чем в течение 2 лет, а у пациенток старше 35 лет — не более 1 года).

*Однако при подсадке эмбриона вероятность наступления беременности менее 30%, а рождения доношенного ребенка ещё меньше.

Скрининг и первичная профилактика



- Профилактика бесплодия заключается в улучшении качества оказания медицинской помощи, а также общей культуре населения.
- Уменьшения количества абортсв и их осложнений
- Своевременная диагностика и лечение ИППП
- Пропаганда здорового образа жизни
- Борьба со стрессом
- Отказ от необоснованных оперативных вмешательств на органах малого таза
- Своевременное планирование детородной функции
- Развитие детской и подростковой гинекологии и андрологии
- Совершенствование эндоскопической хирургии
- Совершенствование гормонотерапии эндокринных нарушений

