

1. Психопатологическая семиотика.
Психопатологическая синдромология.
Определение.
2. Первая помощь при эпилепсии.

Работу выполнила

Студентка 2 курса, группы ЛОГО-1

Сушкова Светлана Викторовна

Психопатологический синдром (иногда называемый психопатологическим симптомокомплексом) — повторяющаяся совокупность симптомов, объединённых единством патогенеза, общими механизмами происхождения и характеризующих текущее состояние лица с психическим расстройством. Психопатологический синдром — одна из важнейших диагностических категорий психиатрии

Психопатологические синдромы делятся на следующие группы:

- аффективные синдромы, указывающие на расстройства настроения: от чрезмерно повышенного настроения с ускорением ассоциативных процессов ([маниакального синдрома](#)) до прямо противоположного ([депрессивный синдром](#));
- бредовые синдромы, указывающие на расстройство мышления и искажённое восприятие действительности, например: [паранойяльный синдром](#), [параноидный синдром](#), [синдром Кандинского — Клерамбо](#);
- аффективно-бредовые синдромы, сочетающие расстройства мышления и настроения, например: сочетание бреда преследования и тревоги ([тревожно-параноидный синдром](#)), сочетание повышенного настроения и фантастических бредовых идей ([маниакально-парафренический синдром](#));
- синдромы двигательных расстройств, например: [кататонический синдром](#), включающий расстройства от ступора до бесцельного [двигательного возбуждения](#);
- синдромы, связанные с органическим поражением мозга: [синдром височной доли](#), [синдром лобной доли](#), [психоорганический синдром](#);
- [синдромы помрачения сознания](#), например: помрачение сознания с наплывом галлюцинаций, парейдолий и двигательным возбуждением — [делириозный синдром](#), сновидное помрачение сознания с фантастическим содержанием переживаний — [онейроидный синдром](#), часто встречаемое помрачение сознания при эпилепсии — [сумеречное](#).
- Синдромы расстройства памяти, например: [синдром Корсакова](#), при котором человек вовсе не может запоминать текущие события.
- Синдромы расстройства восприятия, например: состояние с сильным наплывом галлюцинаций — [галлюцинаторный синдром](#);
- Синдромы расстройства воли: [апато-абулический синдром](#), [абулически-акинетический синдром](#);

Психопатологические синдромы не указывают непосредственно на нозологический диагноз. Тем не менее, существуют определённые закономерности, так, например, синдром Кандинского — Клерамбо и апато-абулический синдром довольно специфичны для параноидной шизофрении и крайне редки при других расстройствах.

Первая помощь при приступе эпилепсии. Если вы оказались рядом, лучшей помощью будет ваше спокойствие и соблюдение следующих правил. 1. Во время приступа больного нельзя переносить, кроме тех случаев, когда ему может угрожать опасность, например, на проезжей части, возле огня, на лестнице или в воде. 2. При повышенном слюноотделении и рвоте больного надо положить на бок или повернуть его голову на бок. Делать это следует мягко, не применяя силу.