
Проект USAID «Флагман» по ВИЧ в центральной Азии

**ОФ «Герлита»
г. Павлодар, 2018г**

О нашем фонде...

- Общественный фонд «Герлита» образован 19.05.2005 года;
- Реализовано свыше 20 международных грантов.
- На данный момент реализуем 2 международных проекта USAID, «Флагман», AFEW, «Проект Противодействия ВИЧ»

ЧТО такое ВИЧ



Этапы развития ВИЧ инфекции

- Первый зарегистрированный случай смерти от СПИДа - в 1959 году в Конго умер мужчина.
- В 1980 году у гомосексуальных мужчин в Соединенных Штатах Америки и Швеции и гетеросексуалов в Танзании начали проявляться признаки того, что позже будет названо СПИДом



Этапы развития ВИЧ инфекции



- В 1981 году Майкл Готтлиб обнаружил в крови инфекцию, убивающую клетки иммунной системы.
- В 1982 году среди ученых появилось название – *синдром* приобретенного иммунодефицита.

Этапы развития ВИЧ инфекции



Вирус иммунодефицита человека был выделен в 1983 году в двух лабораториях: в Институте Пастера во Франции Люком Монтанье и в Национальном институте рака в США Робертом Галло.

Этапы развития ВИЧ инфекции

- 1985 год - изучены основные пути передачи ВИЧ;
- 1987 год – зарегистрирован первый случай ВИЧ инфекции в Казахстане
- с 1997 года ВИЧ инфекция регистрируется во всех областях Казахстана
- 2006 год Шымкент, массовое заражение 149детей в больнице



Этапы развития ВИЧ инфекции

**1986 первый -первый
антиретровирусный
препарат Зидовудин**

**Декабрь 1995 — март 1996
появились первые
ингибиторы протеазы — сакв
инавир, ритонавир,
применение которых
привело к сокращению
смертности с 38 % до 22 %.**



В Павлодарской области на 31 октября 2018 года зарегистрировано 2853 случая ВИЧ-инфекции

- Из них в г. Павлодар - 1922
- г. Экибастуз - 152
- г. Аксу - 332
- Районы - 447

Пути передачи ВИЧ инфекции

Половой путь



Парентеральный



От матери к
ребенку



Как можно обнаружить ВИЧ

- Единственный способ узнать инфицирован ли человек ВИЧ, это сдать лабораторные анализы крови на наличие антител к ВИЧ



Что такое «период окна»?

Период «серонегативного» окна

(сероконверсия)– это время от момента проникновения вируса в организм до появления антител к ВИЧ.







Этот период длится от 3 недель до 3 месяцев. В это время анализы не регистрируют заболевание, но человек уже может заражать других, не подозревая об этом

Стыдно не болеть ВИЧ, Стыдно не знать свой статус

1. В любой поликлинике
2. Центр СПИД, ул. Бектурова 50.
3. Лермонтова 111 кв 1, экспресс тест, результат через 20 минут, анонимно



Как ВИЧ не передается




Мифы ВИЧ инфекции

- ВИЧ можно заразиться где угодно – в общественном туалете, вагоне поезда или на общей кухне в офисе
- Заражение ВИЧ – смертельный приговор.
- Если у человека ВИЧ, то он болен и СПИДом
- У ВИЧ-положительной женщины обязательно родится ребенок, инфицированный ВИЧ. Такой ребенок опасен для окружающих и посещать детский сад он не должен



Права ВИЧ +



Современные наркотики «СОЛИ»

Легко доступный

Дешевый

У человека возникает
эйфорическое состояние

Привыкание с одного раза

Разрушение головного
мозга

Смерть





Спасибо за внимание!

