

Неотложные состояния

Гипертонический криз (неосложненный)

- П/я – клонидин 0,075-0,15 мг или
- Каптоприл – 12,5-25 мг или
- Нифедипин – 10 мг
- При тахикардии – карведилол 12,5-25 мг или пропранолол 10-40 мг
- При задержке жидкости – фуросемид – 40-80 мг
- В/в эналаприлат – 0,625-1,25 мг*
- *Характеристику препаратов см. в слайдах по кардиологии

Приступ стенокардии

- П/я – нитроглицерин -0,4-0,5 мг, можно повторить трехкратно с интервалом 5'
- При отсутствии эффекта – Морфин и НЦ в/в
- При сохраняющейся ишемии + тахикардия – пропранолол, метапролол
- АСК – п/о 160-325 мг/сут. Первую дозу разжевать
- ± Клопидогрель (300 мг → 75 мг/сут)*
- *Характеристику препаратов см. в слайдах по кардиологии

Судорожный синдром

- **Диазепам** – в/в, эффект на «конце иглы», при быстром введении - ↓АД, остановка дыхания
- **Вальпроат Na** – в/в, не угнетает дыхание, не ↓ АД, не влияет на ЭКГ
- **Фенитоин** – м. ч/з назогастральный зонд, не угнетает ЦНС. НО! – аритмии, медленный эффект
- **Тиопентал Na** – в/в, церебропротектор, ↓ ВЧД. НО! – кумуляция, ↓ церебрального кровотока
- **Дроперидол** – при гипертермии, НПЖ, м.б. угнетение дыхания
- **MgSO₄** – в/в – угнетение дыхания
- **Фенобарбитал** – для профилактики
- Подробную Характеристику препаратов см. в «Психотропных средствах»

Гипертемический синдром

- **Парацетамол**
- **Ибупрофен**
- **Ацетилсалициловая кислота**
- **Литическая смесь в/м –
анальгин+димедрол**
- **Подробную характеристику см. в теме «Противовоспалительные средства»**

Приступ бронхообструкции

- **Ингаляции сальбутамола или фенотерола или беродуала – по 2 вдоха – оценить эффективность ч/з 20'**
- **При отсутствии эффекта – повторить еще 2 раза**
- **При отсутствии эффекта – в/в медленно аминофиллин (эуфиллин) – до 10 мл**
- **+ Гидрокортизон 200 мг в/в или Преднизолон 30-60 мг – внутрь**
- **Подробную характеристику см. в теме «БОС»**

Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия

- ПВ – аденозин в/в 6 мг, ч/з 1-2‘ повторить 2 раза
- Препарат 2 ряда – верапамил* в/в
- Препараты резерва – В-блокаторы (пропранолол*), дигоксин*, амиодарон – в/в

* Подробную характеристику см. в кардиологии

Желудочковая тахикардия

- **Лидокаин**
- **Амиодарон**
- **В-блокаторы**

Анафилактический шок

- Эпинефрин (адреналин) в/м 0,5-1 мл 0,1% р-р, можно повторить через 10⁶ под контролем ЧСС и АД
- При крайне тяжелом состоянии 5 мл 0,01% р-ра в/в
- Преднизолон
- Антигистаминные средства 1-го поколения