Неотложные состояния

Гипертонический криз (неосложненный)

- П/я клонидин 0,075-0,15 мг или
- Каптоприл 12,5-25 мг или
- Нифедипин 10 мг
- При тахикардии карведилол 12,5-25 мг или пропранолол 10-40 мг
- При задержке жидкости фуросемид 40-80 мг
- В/в эналаприлат 0,625-1,25 мг*
- *Характеристику препаратов см. в слайдах по кардиологии

Приступ стенокардии

- П/я нитроглицерин -0,4-0,5 мг, можно повторить трехкратно с интервалом 5
- При отсутствии эффекта Морфин и НЦ в/в
- При сохраняющейся ишемии + тахикардия пропранолол, метапролол
- АСК п/о 160-325 мг/сут. Первую дозу разжевать
- \pm Клопидогрель (300 мг \to 75 мг/сут)*
- *Характеристику препаратов см. в слайдах по кардиологии

Судорожный синдром

- Диазепам в/в, эффект на «конце иглы», при быстром введении \Д, остановка дыхания
- *Вальпроат Na* в/в, не угнетает дыхание, не ↓ АД, не влияет на ЭКГ
- *Фенитоин* м. ч/з назогастральный зонд, не угнетает ЦНС. HO! аритмии, медленный эффект
- *Тиопентал Na* в/в, церебропротектор, ↓ ВЧД. НО! кумуляция, ↓ церебрального кровотока
- **Дроперидол** при гипертермии, НПК, м.б. угнетение дыхания
- MgSO4 в/в угнетение дыхания
- Фенобарбитал для профилактики
- Подробную Характеристику препаратов см. в «Психотропных средствах»

Гипертемический синдром

- Парацетамол
- Ибупрофен
- Ацетилсалициловая кислота
- Литическая смесь в/м анальгин+димедрол
- Подробную характеристику см. в теме «Противовоспалительные средства»

Приступ бронхообструкции

- Ингаляции сальбутамола или фенотерола или беродуала по 2 вдоха оценить эффективность ч/з 20'
- При отсутствии эффекта повторить еще 2 раза
- При отсутствии эффекта в/в медленно аминофиллин (эуфиллин) до 10 мл
- + Гидрокортизон 200 мг в/в или Преднизолон 30-60 мг внутрь
- Подробную характеристику см. в теме «БОС»

Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия

- ПВ аденозин в/в 6 мг, ч/з 1-2[°] повторить 2 раза
- Препарат 2 ряда верапамил* в/в
- Препараты резерва В-блокаторы (пропранолол*), дигоксин*, амиодарон в/в

^{*} Подробную характеристику см. в кардиологии

Желудочковая тахикардия

- Лидокаин
- Амиодарон
- В-блокаторы

Анафилактический шок

- Эпинефрин (адреналин) в/м 0,5-1 мл 0,1% р-р, можно повторить через 10° под контролем ЧСС и АД
- При крайне тяжелом состоянии 5 мл <u>0,01%</u> p-pa в/в

- Преднизолон
- Антигистаминные средства 1-го поколения