


# Сестринский уход при хроническом гастрите и язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки

---

Выполнила преподаватель: Андреева Е.В.



# Анатомия органов пищеварения



# Актуальность

---


- гастрит занимает первое место по распространённости среди всех заболеваний органов пищеварения
- по статистическим данным, 60—85 % трудоспособного населения страдает гастритом
- с каждым годом частота хронического гастрита среди населения Российской Федерации возрастает на 1,4 %
- чаще страдают мужчины



# Актуальность


---

- в мире от язвенной болезни страдают около 10% населения, причём у мужчин это заболевание встречается вдвое чаще, чем у женщин
- язвы в двенадцатиперстной кишке образуются в четыре раза чаще, чем в желудке



# Острый гастрит

- является заболеванием, при котором развивается острое воспаление слизистой оболочки желудка, чаще всего от воздействия сильных раздражающих воздействий
- острый гастрит развивается остро и результат полное излечение



# Хронический гастрит

- хроническое воспаление слизистой оболочки желудка с перестройкой ее структуры и прогрессирующей атрофией, нарушениями секреторной, моторной и инкреторной функции



# Хронический гастрит

---


- в западных странах диагноз «хронический гастрит» в последнее время ставится редко, врач обычно ориентируется на симптоматику заболевания и на её основании применяет термин «функциональная диспепсия»



# Хронический гастрит

---

- в России же, наоборот, диагноз «функциональная диспепсия» ставится очень редко, во много раз чаще применяется диагноз «хронический гастрит»





# Язвенная болезнь

---

- это локальный дефект слизистой оболочки желудка или 12 перстной кишки, образующийся под действием кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения



# Язвенная болезнь

---

- если язвенный дефект обнаруживается и в желудке, и в двенадцатиперстной кишке, такие язвы называются сочетанными



# Язвенная болезнь

---

- в отличие от эрозии (поверхностного дефекта слизистой), язва заживает с образованием рубца



# Язвенная болезнь

---


- язвенная болезнь характеризуется рецидивирующим течением, то есть чередованием периодов обострений (чаще весной или осенью) и периодов ремиссии



# Причины заболеваний желудка

---

- не менее 80 % поражений желудка связаны с инфицированием микроорганизмом *Helicobacter pylori*



# Алиментарный фактор

---

- ❑ длительные нарушения качества и ритма питания
- ❑ нарушения жевательного аппарата, плохое пережевывание пищи при быстрой еде
- ❑ питание всухомятку



# Алиментарный фактор

---

- ❑ нарушение ритма и режима питания (большой перерыв между приемами пищи, длительное голодание, обильная еда перед сном)







# Алиментарный фактор

- переедание
- злоупотребление грубой, острой, трудноперевариваемой пищи
- злоупотребление пряностями, копченостями, жирной пищей





# Причины заболеваний желудка

---

- злоупотребление алкоголем, курение



# Причины заболеваний желудка

---

- систематический прием некоторых медикаментозных препаратов (особенно длительный) — салицилаты, резерпин, противотуберкулезные)
- воздействие некоторых химических веществ (профессиональные вредности)
- генетические факторы



# Гастрит – воспаление желудка



# Виды гастритов


## ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА



АНТРАЛЬНЫЙ ГАСТРИТ  
(ГАСТРИТ ТИПА А)



ГАСТРИТ ТЕЛА  
ЖЕЛУДКА  
(ГАСТРИТ ТИПА В)




МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ  
ГАСТРИТ  
(ПАНГАСТРИТ)

# Острый гастрит

- *Симптомами* острого гастрита служат главным образом диспептические явления: потеря аппетита, тошнота, отрыжка, рвота, сначала съеденной пищей, а затем и с примесью желчи. Больные жалуются на режущие боли, чувство давления или жжения в эпигастральной области. Во рту может появляться дурной привкус.
- *При осмотре* язык густо обложен серым налётом. Отмечается запах изо рта (foetor ex ore). При пальпации живота отмечается болезненность в эпигастральной области. В последующем могут присоединяться явления кишечной диспепсии: метеоризм, понос.
- *Общее состояние* больных меняется по-разному. У одних больных состояние остаётся удовлетворительным, и они сохраняют трудоспособность, у других может повышаться температура тела, появляться слабость.

# Классификация хр. гастрита по функциональному признаку:

---





# Хронический гастрит с повышенной КИСЛОТНОСТЬЮ

---

- типично для *молодых* людей
- заболевание очень часто возникает при наследственной предрасположенности



# Хронический гастрит с повышенной КИСЛОТНОСТЬЮ

---

## Жалобы:

- *боли* локализуются в эпигастрии  
*голод — боль — прием пищи — облегчение*



# Хронический гастрит с повышенной КИСЛОТНОСТЬЮ

---

- аппетит нормальный
- тошнота, рвота, которая приносит облегчение
- рвотные массы — кислые, иногда обжигающие, с горечью
- кислая отрыжка и изжога
- стул склонный к запорам



# Хронический гастрит с секреторной недостаточностью

---

- типично для людей *среднего и пожилого возраста*
- в анамнезе хр. гастрит с повышенной кислотностью



# Хронический гастрит с секреторной недостаточностью


---

- ❑ чувство тяжести в эпигастральной области
- ❑ неприятный вкус во рту
- ❑ отрыжка воздухом (иногда тухлым яйцом)
- ❑ метеоризм
- ❑ тошнота
- ❑ стул склонный к поносам



# Хронический гастрит *с пониженной кислотностью*

- хронический гастрит с секреторной недостаточностью относится к группе предраковых заболеваний желудка



# Осложнения гастрита



**Гастрит и его осложнения**

# Клинические проявления язвенной болезни

- *основной симптом **сильная боль в эпигастральной области**, связанная с приемом пищи*
- кислая отрыжка или изжога
- снижение массы тела
- рвота и тошнота после еды





# Характеристика боли при язвенной болезни желудка


---

- **ранние** боли через 30 мин. после еды



# Характеристик боли при язвенной болезни 12 перстной кишки

- возникают так называемые **«голодные боли»** (натощак, принятие пищи приносит облегчение больному)
- **поздние, ночные** возникают не ранее чем через 1,5-2 часа после еды




# Диагностика язвенной болезни

- **ФГДС**  
(фиброгастроэндоскопический метод) *с биопсией*
- *определение РН желудка*  
(суточное мониторирование)
- *рентгенологический метод исследования*  
признак язвенной болезни -  
"ниша"
- *анализ кала на скрытую кровь*




# Осложнения язвенной болезни

- **кровотечение**
- **перфорация** (прободение в брюшную полость)
- **пенетрация** (прободение в другие органы)
- **стеноз привратника** (сужение привратника)
- **малигнизация** (перерождение в рак)



# Сестринский уход хроническом гастрите

- лечение больных проводят в поликлинике
- специальная диета
- контроль за своевременным и полноценным приемом назначенных лечащим врачом лекарственных препаратов
- в комплекс лечебных мероприятий включают физиотерапевтические процедуры (грязелечение, диатермию, электро- и гидротерапию)
- укрепление защитных сил организма



Симптомы гастрита желудка

# Основные группы лекарственных средств



- ингибиторы протонного насоса (омез, омепразол, пантопразол)
- блокаторы H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов (ранитидин, циметидин)
- прокинетики (мотилиум, церукал)
- селективные M-холинолитики (гастроцепин)
- антациды (альмагель, фосфолюгель)









