


Сестринский уход при хроническом гастрите и язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки

Выполнила преподаватель: Андреева Е.В.



Анатомия органов пищеварения




Актуальность

- гастрит занимает первое место по распространённости среди всех заболеваний органов пищеварения
- по статистическим данным, 60—85 % трудоспособного населения страдает гастритом
- с каждым годом частота хронического гастрита среди населения Российской Федерации возрастает на 1,4 %
- чаще страдают мужчины




Актуальность

- в мире от язвенной болезни страдают около 10% населения, причём у мужчин это заболевание встречается вдвое чаще, чем у женщин
- язвы в двенадцатиперстной кишке образуются в четыре раза чаще, чем в желудке



Острый гастрит

- является заболеванием, при котором развивается острое воспаление слизистой оболочки желудка, чаще всего от воздействия сильных раздражающих воздействий
- острый гастрит развивается остро и результат полное излечение



Хронический гастрит

- хроническое воспаление слизистой оболочки желудка с перестройкой ее структуры и прогрессирующей атрофией, нарушениями секреторной, моторной и инкреторной функции




Хронический гастрит

- в западных странах диагноз «хронический гастрит» в последнее время ставится редко, врач обычно ориентируется на симптоматику заболевания и на её основании применяет термин «функциональная диспепсия»



Хронический гастрит

- в России же, наоборот, диагноз «функциональная диспепсия» ставится очень редко, во много раз чаще применяется диагноз «хронический гастрит»



Язвенная болезнь

- это локальный дефект слизистой оболочки желудка или 12 перстной кишки, образующийся под действием кислоты, пепсина и желчи и вызывающий на этом участке трофические нарушения



Язвенная болезнь

- если язвенный дефект обнаруживается и в желудке, и в двенадцатиперстной кишке, такие язвы называются сочетанными



Язвенная болезнь

- в отличие от эрозии (поверхностного дефекта слизистой), язва заживает с образованием рубца




Язвенная болезнь

- язвенная болезнь характеризуется рецидивирующим течением, то есть чередованием периодов обострений (чаще весной или осенью) и периодов ремиссии



Причины заболеваний желудка

- не менее 80 % поражений желудка связаны с инфицированием микроорганизмом *Helicobacter pylori*



Алиментарный фактор

- ❑ длительные нарушения качества и ритма питания
- ❑ нарушения жевательного аппарата, плохое пережевывание пищи при быстрой еде
- ❑ питание всухомятку



Алиментарный фактор

- ❑ нарушение ритма и режима питания (большой перерыв между приемами пищи, длительное голодание, обильная еда перед сном)



Алиментарный фактор

- злоупотребление полуфабрикатами и концентратами
- злоупотребление газированными напитками



Алиментарный фактор

- переедание
- злоупотребление грубой, острой, трудноперевариваемой пищи
- злоупотребление пряностями, копченостями, жирной пищей



Алиментарный фактор

- употребление больших количеств сладкого или сдобы
- низкая калорийность, несбалансированность, недостаточный белковый и витаминный состав пищи
- отсутствие в пищевом рационе полноценных белков



Причины заболеваний желудка

- злоупотребление алкоголем, курение



Причины заболеваний желудка

- систематический прием некоторых медикаментозных препаратов (особенно длительный) — салицилаты, резерпин, противотуберкулезные)
- воздействие некоторых химических веществ (профессиональные вредности)
- генетические факторы



Гастрит – воспаление желудка



Виды гастритов


ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА



АНТРАЛЬНЫЙ ГАСТРИТ
(ГАСТРИТ ТИПА А)



ГАСТРИТ ТЕЛА
ЖЕЛУДКА
(ГАСТРИТ ТИПА В)




МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ
ГАСТРИТ
(ПАНГАСТРИТ)

Острый гастрит

- *Симптомами* острого гастрита служат главным образом диспептические явления: потеря аппетита, тошнота, отрыжка, рвота, сначала съеденной пищей, а затем и с примесью желчи. Больные жалуются на режущие боли, чувство давления или жжения в эпигастральной области. Во рту может появляться дурной привкус.
- *При осмотре* язык густо обложен серым налётом. Отмечается запах изо рта (foetor ex ore). При пальпации живота отмечается болезненность в эпигастральной области. В последующем могут присоединяться явления кишечной диспепсии: метеоризм, понос.
- *Общее состояние* больных меняется по-разному. У одних больных состояние остаётся удовлетворительным, и они сохраняют трудоспособность, у других может повышаться температура тела, появляться слабость.

Классификация хр. гастрита по функциональному признаку:



Хронический гастрит с повышенной КИСЛОТНОСТЬЮ

- типично для *молодых* людей
- заболевание очень часто возникает при наследственной предрасположенности



Хронический гастрит с повышенной КИСЛОТНОСТЬЮ

Жалобы:

- *боли* локализуются в эпигастрии
голод — боль — прием пищи — облегчение



Хронический гастрит с повышенной КИСЛОТНОСТЬЮ

- аппетит нормальный
- тошнота, рвота, которая приносит облегчение
- рвотные массы — кислые, иногда обжигающие, с горечью
- кислая отрыжка и изжога
- стул склонный к запорам



Хронический гастрит с секреторной недостаточностью

- типично для людей *среднего и пожилого возраста*
- в анамнезе хр. гастрит с повышенной кислотностью




Хронический гастрит с секреторной недостаточностью

- ❑ чувство тяжести в эпигастральной области
- ❑ неприятный вкус во рту
- ❑ отрыжка воздухом (иногда тухлым яйцом)
- ❑ метеоризм
- ❑ тошнота
- ❑ стул склонный к поносам



Хронический гастрит *с пониженной кислотностью*

- хронический гастрит с секреторной недостаточностью относится к группе предраковых заболеваний желудка



Осложнения гастрита



Гастрит и его осложнения


Клинические проявления язвенной болезни

- *основной симптом **сильная боль в эпигастральной области**, связанная с приемом пищи*
- кислая отрыжка или изжога
- снижение массы тела
- рвота и тошнота после еды




Характеристика боли при язвенной болезни желудка

- **ранние** боли через 30 мин. после еды



Характеристик боли при язвенной болезни 12 перстной кишки

- возникают так называемые **«голодные боли»** (натощак, принятие пищи приносит облегчение больному)
- **поздние, ночные** возникают не ранее чем через 1,5-2 часа после еды




Диагностика язвенной болезни

- **ФГДС**
(фиброгастроэндоскопический метод) *с биопсией*
- *определение РН желудка*
(суточное мониторирование)
- *рентгенологический метод исследования*
признак язвенной болезни -
"ниша"
- *анализ кала на скрытую кровь*




Осложнения язвенной болезни

- **кровотечение**
- **перфорация** (прободение в брюшную полость)
- **пенетрация** (прободение в другие органы)
- **стеноз привратника** (сужение привратника)
- **малигнизация** (перерождение в рак)



Сестринский уход хроническом гастрите

- лечение больных проводят в поликлинике
- специальная диета
- контроль за своевременным и полноценным приемом назначенных лечащим врачом лекарственных препаратов
- в комплекс лечебных мероприятий включают физиотерапевтические процедуры (грязелечение, диатермию, электро- и гидротерапию)
- укрепление защитных сил организма



Симптомы гастрита желудка

Основные группы лекарственных средств



- ингибиторы протонного насоса (омез, омепразол, пантопразол)
- блокаторы H₂-гистаминовых рецепторов (ранитидин, циметидин)
- прокинетики (мотилиум, церукал)
- селективные M-холинолитики (гастроцепин)
- антациды (альмагель, фосфолюгель)







