


# Коникотомия

Коникотомия – это хирургическая операция по рассечению гортани между двумя хрящами – перстневидным и щитовидным (рассечение конической связки).



# Показания к коникотомии

Показанием к операции могут быть стенозы различной этиологии.

при затруднениях дыхания, если нет ни времени, ни условий для осуществления трахеостомии.

Если больной делает вдох со свистящим шумом и тяжело дышит, медлить с коникотомией нельзя – может возникнуть остановка дыхания.

Коникотомию разрешено делать взрослым и детям, начиная с 8 лет.

**Набор для проведения коникотомии включает в себя:**

- 1) Скальпель хирургический N°10
- 2) Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер 6.0
- 3) Шприц для раздувания манжеты
- 4) Трахеотомический крючок
- 5) Изогнутый кровоостанавливающий зажим
- 6) Лента для фиксации эндотрахеальной трубки

Фирма-производитель: H&H Associates



**Набор для коникотомии Portex**



**Набор для трахеостомии Portex**

# КОНИКОТОМИЯ

Подготовьте для коникотомии

Перчатки стерильные (если есть).

Раствор йода или спирт (если есть).

Режущий предмет, скальпель, нож.

Полую трубку, плоский тупой предмет.

Бинт или пластырь (если есть).



# Техника проведения коникотомии

Наденьте перчатки.

Нащупайте ориентиры

Обработайте шею йодом или спиртом.

Зафиксируйте щитовидный хрящ пальцами левой руки

Пальцами правой руки захватите режущий инструмент на **2 см** от острия для предотвращения перфорации задней стенки трахеи.

Правой рукой сделайте поперечный разрез, одномоментно рассеките кожу и коническую связку.

Раздвиньте края раны тупым плоским предметом (тупым концом скальпеля).

Вставьте в рану полую трубку и зафиксируйте ее бинтом или пластырем. Если нет полрой трубки, можно воспользоваться тупым концом скальпеля, вставить его в разрез и развернуть на 90 градусов.

При отсутствии самостоятельного дыхания проводить искусственное дыхание в трубку или отверстие.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

# **ПУНКЦИОННАЯ КОНИКОТОМИЯ**

**Подготовка**

**Перчатки стерильные (если есть).**

**Раствор йода или спирт (если есть).**

**Широкую полую иглу (лучше с катетером).**

**Бинт или пластырь (если есть).**

**Наденьте перчатки.**

**Нащупайте ориентиры**

**Обработайте шею йодом или спиртом.**

**Зафиксируйте щитовидный хрящ пальцами левой руки (для левшей - наоборот).**

**Правой рукой введите иглу через кожу и коническую связку в просвет трахеи.**

**Зафиксируйте ее пластырем или бинтом. Если используется игла с катетером, выньте иглу.**

**Для увеличения дыхательного потока можно последовательно вставить несколько игл**



**Спасибо за внимание!**

