



Страшное слово - СПИД

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Синдром приобретенного иммунодефицита



Эмблема
Дня борьбы со
СПИДом - красная
ленточка

Был выработан в августе 1987 Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером, двумя сотрудниками по вопросам общественной информации для Глобальной программы по борьбе со СПИДом Всемирной организации здравоохранения в Женеве,



Страшное слово – СПИД

- ❖ Впервые сообщение о новом заболевании было опубликовано 5 июля 1981 года в американском журнале, посвященном различным заболеваниям.
- ❖ В России о первом случае заражения официально объявлено в 1987 году (молодая жительница Санкт - Петербурга). ЯНАО – 1995 год.
- ❖ Ежедневно инфицируются (заражается) 16 тысяч человек.



Нютинация “...но не можешт быть обязан”



Гипотезы на происхождение СПИДа

1 – я гипотеза – большинство исследователей склоняются к мысли, что заболевание возникло в Африке, а затем распространилось на другие территории (США и страны Европы). Согласно африканской гипотезе предшественником ВИЧ могли быть близкородственные вирусы приматов. В Африке были выявлены очаги, где у обезьян достаточно широко распространялся вирус, сходный с вирусом иммунодефицита человека.

2 – я гипотеза – вирус мог приспособиться к жизни в человеческом организме благодаря широкому использованию таких научных достижений 20 века, как пересадки органов и других открытий в медицине, которые могли способствовать формированию как более слабых, так и более опасных форм вируса.

Наступающая “...не может не быть обязан”



Гипотезы на происхождение СПИДа

3 – я гипотеза – искусственное возникновение вируса в конце 70 – х годов на основе бактериологического оружия.



4 – я гипотеза – вирус мог существовать с древних времён, меняя модификацию.



Официально зарегистрированные случаи ВИЧ – инфекции в нашем Красночетайской районе Чувашской Республики – 5 человек. 3 мужчин и 2 женщины. 1- в возрасте до 18 лет, 2- до 30 лет и 2- старше 30 лет. (по данным Красночетайской ЦРБ).

Стадии развития СПИДа

1 стадия – острая инфекция. Она протекает как «гриппоподобное заболевание» (повышение температуры, насморк, кашель, сыпь на коже). Спустя 2-3 нед. Острый период проходит. Следует отметить, что в 60-70 % случаев острое начало может отсутствовать. Человек, не зная о наличии вируса, может заражать других.



2 стадия - асимптомная инфекция (АИ). Полное отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции. Носителей ВИЧ-инфекции можно выявить, только проводя специальные лабораторные исследования.

Наступает «...но не может быть обязан»

Стадии развития СПИДа



3 стадия – персистирующая генерализованная лимфаденопатия (ПГЛ). Возникает через 3-5 лет после второй стадии.

Симптомы болезни: увеличение лимфоузлов, головные боли, расстройства кишечника, упадок сил. Лечение дает кратковременное улучшение, человек еще трудоспособен.



Больной СПИДом



Увеличенные лимфоузлы

4 стадия – пре-СПИД и собственно СПИД. Развиваются поражения слизистых оболочек, лимфоузлов, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, нервной системы. Больной теряет в весе около 10 %. Смертельный исход неизбежен.

Страшное слово – ВИЧ

Пути передачи ВИЧ инфекции

Парентеральный

Через половую связь

совместном использовании загрязненных шприцев и игл лицами, употребляющими наркотики внутривенно

употреблении наркотика, зараженного вирусом, при изготовлении или фасовке;


пользовании общими предметами (посудой для приготовления наркотика, шприцем для деления «дозы», фильтрами);

использовании нестерильного инструментария для нанесения татуировок или пирсинга, совместном использовании маникюрных или бритвенных принадлежностей;

Вертикальный

от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью

Через кровь



Нютаинация “...но методическим быть обязан”

ВИЧ не передается

1

- при дружеских объятиях и поцелуях

2

- через рукопожатия

3

- при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями

4

- через предметы производственной и домашней обстановки

5

- через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем

6

- в общественном транспорте

7

- насекомыми, в том числе и кровососущими

8

- воздушно-капельным путем



Упражнение

Вас пригласили на день рождения к другу(ге). Вы согласились. В разгар праздника из случайного разговора, вы узнали, что среди этих людей есть ВИЧ инфицированный, кто именно вы не знаете. Проиграйте ситуацию. Перемещаясь по помещению, вступайте во взаимоотношения с пришедшими гостями, приветствуя другого, протягивая для этого руку. Если вы почувствуете движение пальца на вашей ладони – вы имеете дело с ВИЧ инфицированным. Исполняющего эту роль ничем себя не выдавать и общаться, как все остальные.

- Кто из вас оказался ВИЧ инфицированным?

- Какие чувства вы испытывали?

- Можно ли заразиться ВИЧ в косметическом или стоматологическом салоне?

- Когда мы рискуем заразиться ВИЧ. Пути передачи.

Меры профилактики СПИДа

соблюдать
правила
личной
гигиены:

не пробовать
и не
прикасаться к
наркотически
м веществам:

при
прокалывани
и ушей
пользоваться
исключитель
но
стерильными
инструмента
ми;

избегать
вступления в
ранние
половые
отношения