


Комбинированные контрацептивы




Комбинированные оральные контрацептивы представляют собой таблетки, содержащие 2 гормона - эстроген и прогестин в различных сочетаниях, которые близки к естественным половым гормонам, вырабатываемым в яичнике каждой женщины.



Как действуют комбинированные таблетки

- *подавляют овуляцию (созревание и выход яйцеклетки)
- *способствует сгущению слизи в шейке матки, делая ее непроходимой для сперматозоидов
- *изменяют слизистую оболочку матки, делая невозможным прикрепление к ней оплодотворенной яйцеклетки
- *уменьшают двигательную способность сперматозоидов в маточных трубах

Сочетание всех этих факторов делает комбинированные оральные контрацептивы самым эффективным методом предупреждения нежелательной беременности.




Комбинированные оральные контрацептивы бывают трех видов:

- *монофазные: содержат 21 таблетку с одинаковым количеством эстрогена и прогестина.**
- *двухфазные: содержат 21 таблетку с двумя различными комбинациями эстрогена и прогестина.**
- *трехфазные: содержат 21 таблетку с тремя различными комбинациями эстрогена и прогестина . Их прием полностью имитирует секрецию эстрогенов и гестагена в течение нормального менструального цикла женщины.**




Каждой женщине подходит свой препарат. В общем случае отметим, что молодым девушкам чаще всего более подходят монофазные таблетки. Наиболее популярны Марвелон и Силест, содержащие прогестины третьего поколения.

Для женщин в зрелом возрасте (после 27 лет) лучшим вариантом выбора являются трехфазные контрацептивы.




Побочные эффекты при применении комбинированных оральных контрацептивов:

- *аменорея (отсутствие менструальноподобных кровотечений в конце цикла)**
- *межменструальные кровотечения и кровянистые выделения**
- *депрессия (изменение настроения или потеря полового влечения)**
- *головные боли (возможны в сочетании с нарушением зрения)**
- *повышение кровяного давления**
- *болезненность молочных желез**
- *увеличение массы тела**
- *снижение полового влечения**



Лекарственные препараты, снижающие контрацептивный эффект:

- *противосудорожные препараты (фенобарбитал, тегретол, дилантин и др.)
- *антибиотики (гризеофульвин, рифампин, ампициллин и тетрациклин)



Спасибо за внимание!!!)

