

Булеву функцию одного аргумента можно определить таблицей:

X' -функция называется отрицанием.

X	X'
0	1
1	0

В таблице(ниже) приведены основные булевы функции от двух аргументов:

X	Y	$X \cdot Y$	$X \vee Y$	$X \rightarrow Y$	$X \leftrightarrow Y$	$X Y$	$X \downarrow Y$	$X + Y$
0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0

Здесь: $X \cdot Y$ - конъюнкция, $X \vee Y$ - дизъюнкция, $X \rightarrow Y$ - импликация, $X \leftrightarrow Y$ - эквивалентность, $X | Y$ - штрих Шеффера, $X \downarrow Y$ - стрелка Пирса $X + Y$ - сумма Жегалкина.

Иван Иванович Жегалкин (1869-1947) – российский математик и логик, один из основоположников современной математической логики. Из его открытий наибольшую известность получил так называемый полином Жегалкина. Жегалкин награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В своем письме М. Я. Выгодскому известный советский математик Николай Лузин, вспоминая студенческие годы, говорит, что из профессоров не боялся лишь Жегалкина.

Чарльз Сандерс Пирс (1839-1914) – американский философ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики.

Ввёл в философию термин фанерон, предложил концепцию тихизма. В логику — стрелку Пирса, в картографию — проекцию Пирса. Немецкий философ Апель назвал Пирса «Кантом американской философии».

Число булевых функций n аргументов равно 2^{2^n} . Для задания булевой функции $f(a_1 a_2 a_3 a_4 \dots a_n)$ нужно указать её значение для каждого из 2^n различных значений её аргументов. Если значение функции равно 0, то такая функция постоянна и называется константой 0.

Если значение функции равно 1, то такая функция называется константой 1.

Для функций справедливы равенства:

1. $a \vee a = a; a a = a$
2. $a \vee b = b \vee a; a b = b a$
3. $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c); (a b) c = a (b c)$
4. $a \vee 1 = 1, a \cdot 1 = a$
5. $a \vee (b \cdot c) = (a \vee b) \cdot (a \vee c)$
6. $a \cdot (b \vee c) = (a \cdot b) \vee (a \cdot c)$
7. $a \vee (b \cdot a) = a; a \cdot (b \vee a) = a$
8. $(X \vee Y)' = X' \cdot Y'; (X \cdot Y)' = X' \vee Y'$
9. $X \vee X' = 1; X \cdot X' = 0$
10. $X'' = X$
11. $a \vee 0 = a; a \cdot 0 = 0$
12. $a \rightarrow b = a' \vee b'$
13. $a \leftrightarrow b = (a \rightarrow b) \cdot (b \rightarrow a)$

Все приведённые выше формулы проверяются с помощью таблиц булевых функций. Докажем последнюю формулу.

1. Составим таблицу:

a	b	$a \leftrightarrow b$	$a \rightarrow b$	$b \rightarrow a$	$(a \rightarrow b) \cdot (b \rightarrow a)$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1

2. Сравним третий и шестой столбцы, видим, что они одинаковы, значит функции стоящие в левой и правой части доказываемой формулы, принимают одинаковые значения для одинаковых наборов аргументов

Конъюнктивным(дизъюнктивным) одночленом от переменных $(a_1, a_2, a_3 \dots a_n)$ называется конъюнкция(дизъюнкция) этих переменных или их отрицаний.

Формула, равносильна данной формуле алгебры высказываний и являющаяся дизъюнкцией элементарных произведений (конъюнктивных одночленов), называется дизъюнктивной нормальной формулой(ДНФ) данной формулы:

Например: $ABC \vee A\bar{B} \vee CB \vee \bar{C}$ - ДНФ

Формула, равносильна данной формуле алгебры высказываний и являющаяся конъюнкцией элементарных произведений (дизъюнктивных одночленов), называется конъюнктивной нормальной формулой(КНФ) данной формулы.

Например: $(\bar{A} \vee B \vee C)(A \vee \bar{C})B$ – КНФ.

Для каждой формулы алгебры высказываний можно найти множество дизъюнктивных и конъюнктивных нормальных форм. Для этого нужно:

- 1) Избавится от всех логических операций, содержащихся в формуле, заменив их основными – конъюнкцией, дизъюнкцией, отрицанием. Это можно сделать используя равносильные формулы: $A \rightarrow B = A \vee B'$; $A \leftrightarrow B = (A \vee B) \cdot (A' \vee B')$; $A \leftrightarrow B = (A \cdot B) \vee (A' \cdot B')$.
- 2) Заменить знак отрицания, относящийся к выражениям типа AB или $A \vee B$, знаками отрицания. Относящимся к отдельным переменным высказываниям на основании формул $A \vee B = A \vee B$; $A'B' = A' \vee B'$
- 3) Избавится от знаков двойного отрицания: $A = A''$
- 4) Применить, если нужно, к операциям конъюнкции и дизъюнкции свойства дистрибутивности, формулы поглощения.

Теорема: Формула алгебры высказываний является тождественно ложной тогда и только тогда, когда каждое слагаемое (т. е. каждое элементарное произведение) ее ДНФ содержит пару сомножителей, один из которых есть элементарное высказывание, другой — его отрицание.

Можно построить КНФ для отрицания исходной формулы. Если окажется, что она удовлетворяет условиям теоремы, то исходная формула невыполнима, так как ее отрицание тождественно истинно.

В не перечисленных выше случаях формулы являются вы полнимыми.

Рассмотрим, например, формулу:

$$(a \wedge b \wedge c)(a \wedge b \wedge c)(a \wedge b \wedge c)$$

При приведении этой формулы к КНФ среди дизъюнктивных одночленов будет $a \vee b \vee c$, что противоречит условию существования тавтологии. Поэтому данная формула - не тавтология. При решении ряда задач часто бывает удобно использовать совершенную дизъюнктивную нормальную форму функции (СДНФ) или совершенную конъюнктивную нормальную форму функции (СКНФ).

Одночлен от некоторых переменных называется *совершенным*, если каждая из этих переменных входит в него точно **один раз** либо со знаком отрицания, либо без него.

Нормальная форма от некоторых переменных называется **совершенной**, если каждый входящий в нее одночлен является **совершенным одночленом** от тех же самых переменных.

Совершенной дизъюнктивной нормальной формой функции (СДНФ) будем называть функцию вида:

$$\Phi(a_1, a_2, a_3, a_4 \dots a_n) = \exists \Phi (b_1, b_2, b_3, b_4 \dots b_n) , \\ (a_1^{b_1}, a_2^{b_2}, a_3^{b_3} \dots a_k^{b_k}) ,$$

Где

$$a^b = \begin{cases} 0, & \text{если } b = 1 \\ a, & \text{если } b = 0 \end{cases}$$

А дизъюнкция распространяется на все выражения $(a_1^{b_1}, a_2^{b_2}, a_3^{b_3} \dots a_k^{b_k})$, для которых $\Phi (b_1, b_2, b_3, b_4 \dots b_n) = 1$.

Конструктивно СДНФ для каждой формулы алгебры высказываний, приведенной к ДНФ, можно определить так:

Совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) формулы алгебры высказываний называется ее ДНФ, обладающая следующими свойствами:

- 1. ДНФ не содержит двух одинаковых слагаемых.*
- 2. Ни одно слагаемое не содержит одновременно двух одинаковых сомножителей.*
- 3. Ни одно слагаемое не содержит одновременно некоторое высказывание и его отрицание.*
- 4. Каждое слагаемое содержит в качестве сомножителя либо переменное высказывание, либо его отрицание для всех переменных входящих в формулу.*

Приведем, например, к СДНФ булеву функцию $(a \vee b') \cdot (a \rightarrow c)$.

Используя свойства булевых функций, получаем:

$$(a \vee b') \cdot (a \rightarrow c) = (a' \cdot b') \vee (a' \cdot c) = (a' \cdot b' \cdot a') \vee (a' \cdot b' \cdot c) = (a' \cdot b') \vee (a' \cdot b' \cdot c) = a' \cdot b' \cdot (c \vee c') = (a' \cdot c \cdot b') \vee (a' \cdot c' \cdot b')$$

Совершенной конъюнктивной нормальной формой функции (СКНФ) будем называть функцию вида:

$$\Phi(a_1, a_2, a_3, a_4 \dots a_n) = \bigvee \Phi(b_1, b_2, b_3, b_4 \dots b_n), \\ (a_1^{b_1} \vee a_2^{b_2} \vee a_3^{b_3} \dots \vee a_k^{b_k}),$$

Где

$$a^b = \begin{cases} 0, & \text{если } b = 0 \\ a, & \text{если } b = 1 \end{cases}$$

А конъюнкция распространяется на все выражения

$(a_1^{b_1} \vee a_2^{b_2} \vee a_3^{b_3} \dots \vee a_k^{b_k})$, для которых $\Phi(b_1, b_2, b_3, b_4 \dots b_n) = 0$

Конструктивно СКНФ для каждой формулы алгебры высказываний, приведенной к КНФ, можно определить так: *Совершенной конъюнктивной нормальной формой* (СКНФ) данной формулы алгебры высказываний называется такая ее КНФ, которая удовлетворяет следующим свойствам.

1. КНФ не содержит одинаковых сомножителей.

2. Ни один из сомножителей не содержит **двух** одинаковых слагаемых.

3. Ни один сомножитель не содержит одновременно некоторое переменное высказывание и его отрицание.

4. Каждый сомножитель СКНФ содержит в качестве слагаемого либо переменное высказывание, либо его отрицание для всех переменных высказываний, входящих в формулу.

Из определений и теорем следует, что тождественно истинная формула не имеет СКНФ, а тождественно ложная не имеет СДНФ.

Каждая не тождественно истинная и не тождественно ложная формула имеют единственные СКНФ и СДНФ.

Можно доказать следующие утверждения.

Каждая булева функция от n переменных, отличная от константы 0, имеет единственную (с точностью до перестановки дизъюнктивных членов) СДНФ.

Каждая булева функция от n переменных, отличная от константы 1, имеет единственную (с точностью до перестановки конъюнктивных членов) СКНФ.

Рассмотрим обратную задачу. Задана некоторая функция $f(x_1, x_2 \dots x_n)$ своей таблицей истинности, нужно построить для нее формулу. Задача эта неоднозначна, существует множество равносильных между собой формул, соответствующих данной функции. Будем строить СДНФ. СДНФ содержит столько слагаемых, сколько единиц имеет истинностная таблица. Эти единицы соответствуют тем наборам переменных, при которых каждое слагаемое ('элементарная конъюнкция) обращается в единицу, т. е. переменным, входящим в элементарную конъюнкцию без знака отрицания, соответствует 1, а со знаком отрицания 0.

Чтобы написать СКНФ по заданной истинностной таблице, нужно выбрать все встречающиеся в ней значения 0 и рассмотреть наборы значений переменных, отвечающие этим нулям.

СКНФ содержит столько сомножителей, сколько нулей имеет истинностная таблица. Эти нули соответствуют тем наборам переменных, при которых каждый сомножитель (каждая элементарная сумма) обращается в нуль, т. е. переменным, входящим в элементарную сумму без знака отрицания, соответствует 0, а со знаком отрицания 1...

Построим, СДНФ и СКНФ для формулы $A = (p \rightarrow q) \wedge (p \vee q)$.
Для решения задачи используем истинную таблицу для A .

p	q	q	$p \rightarrow q$	$p \vee q$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \vee q)$
1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0

В таблице отметим строки, где A принимает значение 1 (3 и 4 строки). В третьей строке $A=1$, если $p=1$, $q=0$, составим конъюнкцию $p \wedge \bar{q}$. В четвертой строке $A=1$ если $p=0$, $q=1$, следовательно $p \wedge q$. Полученные конъюнкции соединим законом дизъюнкции и получим СДНФ.

$$B = (p \wedge \bar{q}) \vee (p \wedge q)$$



Отметим в таблице строки, в которых $A = 0$. Это вторая и пятая строки. Составим дизъюнкции: для второй строки $\bar{p} \vee \bar{q}$, для пятой строки $p \vee q$. Соединив дизъюнкции конъюнкцией, получим СКНФ:

$$C = (p \vee q) \wedge (\bar{p} \vee \bar{q})$$

Если построить истинные таблицы то можно проверить эквивалентности A и B , A и C .

p	q	q	p → q	p ∨ q	(p → q) ∧ (p ∨ q)
1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0

Например используя СКНФ, найдем булеву функцию, принимающую значение 0 на следующих наборах переменных, и только на них:

$$f(0,0,0) = f(0,1,0) = f(0,1,1) = 0$$

Выпишем наборы переменных при которых булева функция обращается в нуль: $(0,0,0), (0,1,0), (0,1,1)$. Для каждого набора выпишем совершенный, дизъюнктивный одночлен, обращающийся в нуль только на этом наборе переменных: $f(0,0,0)=0$ если $a \vee b' \vee c$; $f(0,1,0)=0$ если $a \vee b' \vee c$; $f(0,1,1)=0$

Если $a' \vee b' \vee c'$. Соединяя полученные совершенные дизъюнктивные одночлены конъюнкцией, получим СКНФ:

$$f(a, b, c) = (a \vee b \vee c) (a \vee b' \vee c) (a \vee b' \vee c)$$

Система булевых функций $\{f_1, f_2, f_3 \dots f_m\}$ называется **полной**, если любая функция может быть выражена через функции $f_1, f_2, f_3 \dots f_m$ с помощью суперпозиций. Пусть $K^0 = \{f_1(x_1 x_{k1}) f_2(x_1 x_{k2}) \dots f_m(x_1 x_{km})\}$ — конечная система булевых функций. Функция f называется *элементарной суперпозицией* (суперпозицией ранга 1) функций f_1, f_2, \dots, f_m если f может быть получена одним из следующих способов:

- а) переименованием некоторой переменной x , какой-нибудь функции f_i .
- б) подстановкой некоторой функции f_i ($1 \leq i \leq m$) вместо какой-либо переменной x любой из функций $f_n \in K^0$.

Суперпозиции ранга 1 образуют класс функций K^1 . Класс функций, получающийся из функций класса K^{s-1} суперпозицией ранга s — 1 с помощью элементарных суперпозиций, называется *классом функций K^s суперпозиций ранга s* . Суперпозициями функций из K^0 называются функции, входящие в какой-то из классов K^s .

Согласно введенным определениям, можно говорить, что система булевых функций полна. Тогда любую булеву функцию можно представить в виде многочлена от своих переменных.

Многочленом Жигалкина называется многочлен, являющийся суммой константы 0 или 1 и различных одночленов, в которые все переменные входят не выше, чем в первой степени.

Теорема: Любая функция булевой алгебры может быть представлена, и притом единственным образом, с помощью полинома Жигалкина вида $J = \sum a_j x_j x_j$.

Представим, например, B^j виде полинома выражение вида $X_1 \vee X_2$. Для этого проведем следующие рассуждения.

Пусть

$$X_1 \vee X_2 = a X_1 X_2 + b X_1 + c X_2 + k, \text{ где } a, b, c, k \text{ — неопределенные коэффициенты.}$$

При $X_1 = X_2 = 0$ имеем $k = 0$. При $X_1 = 1, X_2 = 0$ имеем $b = 1$. При $X_1 = 0, X_2 = 1$ имеем $c = 1$. При $X_1 = X_2 = 1$ имеем $a + b + c = 1$, т. е. $a = -1$. Таким образом, получаем: $X_1 \vee X_2 = -X_1 X_2 + X_1 + X_2$.

Пусть дана булева функция $f(x_1 \dots x_k)$. Функция $f^*(x_1 \dots x_k)$ называется двойственной если $f^*(x_1 \dots x_k) = \bar{f}(x_1 \dots x_k)$

Двойственной к $f(x_1) = 0$ является $f(x_2) = 1$ и, наоборот, двойственной к $a \vee b$, является $a \wedge b$ и наоборот.

Функция называется самодвойственной, если $f(x_1 \dots x_k) = f^*(x_1 \dots x_k)$.

Функция называется линейной, если $f(x_1 \dots x_k) = a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_k x_k$, где $a_i \in \{1, 0\}$.

Функция называется монотонной, если для любых α и β из списка переменных таких, что $\alpha \leq \beta$, имеем $f(\alpha) \leq f(\beta)$.

Множество K булевых функций называется функционально замкнутым, если вместе с функциями из этого класса он содержит все их суперпозиции.

Справедливо следующее утверждение: никакая полная система булевых функций не может содержаться в функционально замкнутом классе отличном от класса K^1 всех булевых функций.

Функционально замкнутыми являются следующие классы:

T_0 — класс функций, сохраняющих 0 ($f(0, 0, \dots, 0) = 0$);

T_1 — класс функций, сохраняющих 1 ($f(1, 1, \dots, 1) = 1$);

S — класс самодвойственных функций;

L — класс линейных функций;

M — класс монотонных функций.

Теорема Поста: Для того чтобы система булевых функций $\{f_x, f_y \dots f_m\}$ была полной, необходимо и достаточно, чтобы для каждого из классов T_0, T_1, S, L, M нашлась функция f_i не принадлежащая этому классу.

Докажем, например, полноту системы $\{+, \vee, 1\}$. Составим таблицу Поста (ниже): в клетках таблицы будем писать + или - в зависимости от того, принадлежит рассматриваемая функция выбранному замкнутому классу или нет.

f			S	L	M
$A + B$	+	-	-	+	-
$A \vee B$	+	+	-	-	+
1	-	+	-	+	+

Согласно теореме Поста, для полноты системы необходимо и достаточно, чтобы в каждом столбце был хотя бы один минус. Следовательно, рассматриваемая система полна.

Система функций W называется независимой, если никакая функция $f \in W$ не представляется суперпозициями функций из множества $W \setminus \{f\}$.

Независимая система функций называется *базисом* функционального замкнутого класса K , если всякая функция из K — суперпозиция функций из W .

Например, система функций $\{+, \cdot, 1\}$ независимая, так как $+ \in T_1, \cdot \in T_1, 1 \in T_1, + \in L, \cdot \in L, 1 \in L, + \in T_0, \cdot \in T_0, 1 \in T_0$.