


Причина головной боли.

 Чтобы после окончания действия лекарства болевой синдром снова не появился, необходимо устранить причину его появления.



Причину головной боли можно установить, правильно определив ее локализацию.

Характер боли и локализация.

Самые распространенные виды регулярной головной боли



Мигрень Сильная пульсирующая боль в одном участке головы



Гипертония
Тяжелая пульсирующая боль, как правило, в области затылка



Стресс Длительная боль, "сжимающая" голову как обруч



Грипп, ОРЗ
Локальная боль в области надбровных
дуг, висков и лба



Остеохондроз Резкая боль при движении в затылочной части и у вискев

Наличие других симптомов.






или поесть







Принять ванну с морской солью



Выйти на свежий воздух



Надеть теплый шарф





Сделать легкий массаж головы



Выпить зеленого чая с мятой или чередой


Если болит голова

Головная боль как с ней бороться

Четверо из пяти человек испытывают головные боли от перенапряжения, а каждый седьмой — страдает от мигрени

Виды головной боли


• Похмелье: под действием алкоголя сосуды в мозгу расширяются, а также изменяется эффект воздействия серотонина на нервные окончания. Алкоголь может вызвать как мигрень, так и накатывающие приступы головной боли



- Мигрень неврологическое заболевание, эпизодические или регулярные приступы боли с одной стороны головы, которые длятся более четырех часов. Иногда появляется во время диеты
- Лечение: препараты от мигрени, например триптан



- От напряжения наиболее распространенный вид головной боли. Давление или напряжение головы. Может длиться от нескольких минут до недели. Появляется в результате стресса или из-за проблем с мышцами лица и шеи.
- Лечение: упражнения, ибупрофен или парацетамол



- Гистаминовая (пучковая) головная боль сильная пульсирующая боль вокруг глаза с одной стороны лица. Длится до четырех часов, часто сопровождается покраснением глаза, слезами и насморком.
- Лечение: кислородная терапия или суматриптан (лекарство от мигрени)

Серьезные заболевания

• Менингиты

Головная боль с высокой температурой и онемением в шее. Может появляться сыпь. Требует немедленной госпитализации

Источник: www.migraine.org.uk, ouchuk.org, Технический Университет Берлина в Германии

• Опухоль мозга

Головные боли появляются в менее чем 4% случаях опухоли мозга. Опухоли вызывают повышенное внутричерепное давление, которое в свою очередь вызывает все более сильные утренние головные боли и приступы рвоты. Требует незамедлительного лечения


Субарахноидальное кровоизлияние

Внезапные острые головные боли, зачастую в затылочной части. Могут быть вызваны внутренним кровоизлиянием. Обычно являются результатом разрыва аневризмы в основании мозга. Требуют незамедлительного лечения

Виды головной боли:



1. Головные боли, вызванные сосудистыми заболеваниями



2. Психогенные головные боли




Головная боль напряжения проблема офисных работников.


Headexpert.ru

3. Головные боли, связанные с ликвородинамическими и внутричерепными патологиями

Система циркуляции цереброспинальной (спинномозговой) жидкости, или ликвора



ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ




4. Кластерные головные боли



При кластерной головной боли недомогание возникает с одной части головы, сопровождается слезливостью, покраснением лица.

Headexpert.ru

5. Боли головы, не связанные с нарушением мозговых структур




Таблетки от головной боли.







Парацетамол





Парацетамол

20 таблеток по 500 мг




Мигренол






Солпадеин





Анальгин - Метамизол натрия





Ибупрофен

Брустан



Спасибо за внимание!