

Тақырыбы: Нефротикалық синдром



Орындаған: Бекниязова Мөлдір, 730
топ

Тексерген: Молдажарова Н.Е

Жоспар:

- Анықтамасы
- Этиологиясы
- Патогенезі
- Клиникасы
- Диагностикасы
- Емі


АНЫҚТАМАСЫ

- Жедел нефротикалық синдром (ісіну, артериалды гипертензия, гематурия, протеинурия, азотемия) – көпшілік жағдайда жиі b-гемолитикалық стрептококкпен немесе басқа қоздырғыштармен шақырылатын жедел гломерулонефрит көрініс болып табылады.

Қауіп факторлары:

- b-гемолитикалық стрептококкпен шақырылған (оның ішінде баспа, фарингит, пиодермия, жәншау) инфекция; Басқа инфекциялармен шақырылған инфекциялар; Арнайы емес факторлар (дәрілік заттар, жарақат, аллергиялық реакциялар, салқындау); Тұқымқу
- алаушылық бейімділік;

Строение нефрона



Диагностика белгілері:

- алғаш пайда болған жедел нефротикалық синдром (симптомдар триадасы) кофе, шай түсті немесе «ет жуындысы» тәрізді зәр (гематурия) бет, аяқтарда, тұлғада ісінулер диурез төмендеуі артериалды гипертензия солқарыншалық жүрек жетіспеушілік (жиі гипертониялық): тахикардия ортопноэ-тахипноэ гипертониялық энцефалопатия жүрек айну құсу бас ауруы іш ауырсынуы, белдегі ауырсыну (ЖБЖ) қызба

(1) Генерализованные
отеки:



Диагностикасы:

- Лабораториялық зерттеулер:
Иммунологиялық процесс шамалы көріністері: ЭТЖ жоғарылауы 20-30 мм/сағ антистрептококкты антиденелер титрінің өсуі (антистрептолизин-О, антистрептокиназа, антигиалуронидаза) гипокомplementемия С3-компонент және жалпы криоглобулин төмендеуі есебінен ШФЖ төмендеуі, сарысулық креатинин деңгейі жоғарылауы

Диагностикасы:

- Жалпы зәр анализі: салыстырмалы тығыздығының жоғарылауы эритроциттер бірен сараң немесе көру алаңын тұтас жабуға дейін цилиндрлер (жиі гиалинді) протеинурия минимальды немесе шамалы (3 г/тәул дейін)

- ЖБЖ дамыған кезде тәуліктік зәрдің азаюы: + олигурия (500 мл/тәул-тен аз) анурия (100 мл/тәул-тен аз) араңнан жағынды алу келесі бактериологиялық зерттеумен (баспа немесе фарингит болған кезде)

Емі:

- Клиникалық нұсқаулықтар Төсектік режим, одан кейін жартылай төсектік (1-3 апта), ісіну қайтып, АҚ қалпына келгенде – режимді кеңейту+ Ас тұзын қабылдауды 1-2г/тәул дейін шектеу Сұйықтық ішуді шектеу (алдыңғы күн диурезіне +300мл есебінен) Нәруызды 0,5-1г/кг/тәул шектеу

Емі:

- Постстрептококкты ЖГН кезінде антибактериалды терапия жүргізеді:
Бензилпенициллин Цефалексин 25-50 мг/кг
- Синуситтер мен пневмония кезінде антибактериалды терапия жүргізеді:
Амоксициллин 20мг/кг Цефаклор 20мг/кг

Емі:

- β -лактамыды антибиотиктерге аллергия болған кезде антибактериалды терапияны макролидтер тобының препараттарымен жүргізеді: эритромицин 20-40 мг/кг азитромицин 5-10 мг/кг спирамицин 1,5 млн ХБ /10 кг
- Ісінулер мен солжаққарыншалық жетіспеушілік кезінде қолданады: Тиазидті диуретиктер «ілмекті» диуретиктер Альдостерон антагонисттері

Емі:

- АГ кезінде: АПФ ингибиторлары (фозиноприл, эналаприл) Кальций каналдарының блокаторлары (верапамил). Дене салмағы 20-дан 50-ге дейінгі науқастарға алғашқы дозасы 2,5 мг және дене салмағы 50кг және одан жоғары науқастарға алғашқы дозасы 50мг-нан тағайындалады. Диуретиктер 1-2мг/кг.