

Методика и длительность поддерживающей терапии

2 года

5 лет

Неопределенно долго

Continuous low-dose strategies

Intermittent or targeted treatment

Drug holiday

Выделение одного или нескольких дней в неделю, свободных от приема лекарств

Однократный прием в течение дня для пероральных форм

Прием препаратов через 1 или 2 дня в неделю

Прием препаратов короткими циклами

Постепенное увеличение временного интервала между инъекциями для пролонгированных форм

Антипсихотики пролонгированного действия (*Psychotropic Drug Directory, 2007*)

Препарат	Доза в/м	T действия, недели	Tmax, дни	Tss, недели	+ 1/2 singl.dose	+ mult. dose
Галоперидол- деcanoат	50-300	4-6	3-9	10-12	18-21 день	18-21 день
Зуклопентиксол- ацетат (клопиксол- акуфаз)	50-200	0.5	1-2		32 часа	32 часа
Зуклопентиксол- деcanoат (клопиксол-депо)	20-750	2-4	4-9	10-12	17-21 день	17-21 день
Типотиазин- пальмитат (пипортил L 4)	25-200	4-6	9-10	8-12	14-21 день	14-21 день
Флупентиксол- деcanoат (флюанксол- депо)	20-200	2-4	7-10	10-12	8 дней	17 дней
Флуфеназин- деcanoат (модитен-депо)	25-100	1-3	1	6-12	6-10 дней	14-100 дней