скрининга для выявления групп риска по антисоциальному, аддиктивному и суицидальному поведению.

Статистика подростковой преступности

- Удельный вес преступлений, совершённых подростками, в общем массиве преступлений за последние три года возрос с 6,7% в 2008 году до 8,2% в 2011 году как в целом по России, так и в Новосибирской области.
- За 1 квартал 2012 г подростками и с их участием совершено 512 преступлений, рост составил 28 %, также отмечается значительный рост количества лиц (77 подростков), совершивших преступления повторно, рост составил 8,5%.
- Складывающиеся тенденции на протяжении трех прошедших лет позволяют прогнозировать рост как уровня подростковой преступности, так удельного веса преступлений, совершаемых подростками либо с их участием.

Детские и подростковые самоубийства: статистика и тенденции

- Суицидальная ситуация среди детей и подростков в Новосибирской области оценивается как крайне неблагополучная.
- За последние 3 года наблюдается рост законченных суицидов.
- В 1 квартале 2012 г. 33 подростка совершили суицидальные попытки, из них 7 законченных суицидов. Это на 5 случаев больше по сравнению с 1 кв. 2011 г.
- Работа по профилактике самоубийств носит в основном вторичный характер, поскольку ведется преимущественно по незавершенным случаям.

Методы исследования предрасположенности к суициду в формате первичной профилактики

- 1.Диагностическое интервью с семейным анамнезом.
- 2. Тест Личко (143 вопроса).
- 3. Тест Розенцвейга (24 схематических рисунка)
- 4. Тест Басса (75 утверждений).
- 5. Тест тревожности Тэммл-Дорки-Амен (14 рисунков).

Очевидна необходимость поиска наименее затратных способов первичной профилактики девиантного поведения.

Причины самоубийств

ВОЗ насчитывает 800 причин самоубийств. Из них рассматриваются как основные:

- 1. Конфликт в личной жизни.
- 2. Одиночество.
- 3. Воздействие искусства.
- 4. Неразделённые чувства.
- 5. Нестандартная ориентация.
- 6. Разрушение этнических традиций.
- 7. Генетическая предрасположенность к суициду.
- 8. Психотравма, депрессия.

Генетика и особенности психотипа как основа девиантной личности:

генотип фенотип характер компенсаторные реакции и механизмы, адаптированность.

Генетические основы антисоциального, аддиктивного и суицидального поведения можно определить по внешним данным (фенотип), зная законы фенотипологии.

Фенотипология - это наука, позволяющая по внешнему виду человека определить его характер, а также различные психологические особенности. В отличие от физиогномики,



Фенотипологический пример личности, склонной к суициду

Иллюстрация взята из статьи в интернете, посвященной проблеме подростковых самоубийств. Модель подобрана крайне удачно: даже по видимому фрагменту лица видно 7 фенотипологических признаков, относящих изображенного на снимке к группе высокого риска по суициду.

Школьники-самоубийцы (2012







Видеокомпьютерный психоанализ (ВКПА)

Ануашвили Автандил Николаевич

Доктор психологических наук, доктор технических наук, профессор.








Видеокомпьютерный психоанализ



«Духовный» портрет





Исходный портрет







«Жизненный» портрет



Типология по Ануашвили А.Н.



Типология склонности к антисоциальным явлениям



Вероятность попадания в группу «Агрессия»

(мошенничество, хулиганство, проституция, бандитизм,

L80S80	L70S80	L60S80	LI S80	160S80	170S80	180S80
35 %	30 %	25 %	20 %	15 %	10 %	5 %
L80S70	L70S70	L60S70	LI S70	160S70	170S70	180S70
40 %	35 %	30 %	25 %	20 %	15 %	10 %
L80S60	L70S60	L60S60	LI S60	160S60	170S60	180S60
45 %	40 %	35 %	30 %	25 %	20 %	15 %
L80 SD	L70 SD	L60 SD	LI SD	160 SD	170 SD	180 SD
50 %	45 %	40 %	35 %	30 %	25%	20 %
L80D60	L70D60	L60D60	LI D60	160D60	170D60	180D60
60 %	55 %	50 %	45 %	40 %	35 %	30 %
L80D70	L70D70	L60D70	LI D70	160D70	170D70	180D70
70 %	65 %	60 %	55 %	50 %	45 %	40 %
L80D80	L70D80	L60D80	LI D80	I60D80	170D80	180D80
80 %	75 %	70 %	65 %	60 %	55 %	50 %

Вероятность попадания в группу «Депрессия»

(алкоголизм, наркомания, блуд, сектантство, мазохизм)

L80S80	L70S80	L60S80	LI S80	160S80	170S80	180S80
5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %
L80S70	L70S70	L60S70	LI S70	160S70	170S70	180S70
10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %
L80S60	L70S60	L60S60	LI \$60	160S60	170S60	180S60
15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
L80 SD	L70 SD	L60 SD	LI SD	160 SD	170 SD	180 SD
20 %	25%	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %
L80D60	L70D60	L60D60	LI D60	160D60	170D60	180D60
30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
L80D70	L70D70	L60D70	LI D70	I60D70	I70D70	I80D70
40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
L80D80	L70D80	L60D80	LI D80	I60D80	I70D80	I80D80
50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

Усредненная вероятность попадания в антисоциальные группы

L80S80 20% (5-35)	L70S80 20% (10-30)	L60S80 20 % (15-25)	LI S80 20%	I60S80 20 % (15-25)	170S80 20% (10-30)	180S80 20% (5-35)
L80S70 25 % (10-40)	L70S70 25% (15-35)	L60S70 25% (20-30)	LI S70 25 %	I60S70 25 % (20-30)	170S70 25% (15-35)	180S70 25% (10-40)
L80S60 30 % (15-45)	L70S60 30% (20-40)	L60S60 30% (25-35)	LI S60 30%	160S60 30% (25-35)	170S60 30% (20-40)	I80S60 30% (15-45)
L80 SD	L70 SD	L60 SD	LI SD	I60 SD	170 SD	180 SD
35%	35%	35%	37,5 %	35%	35%	35%
(20-50)	(25-45)	(30-40)	(35-40)	(30-40)	(25-45)	(20-50)
L80D60	L70D60	L60D60	LI D60	I60D60	170D60	180D60
45 %	45 %	45 %	50 %	45%	45%	45 %
(30-60)	(35-55)	(40-50)	(45-55)	(40-50)	(35-55)	(30-60)
L80D70	L70D70	L60D70	LI D70	160D70	170D70	180D70
55%	55%	55%	62,5 %	55%	55%	55%
(40-70)	(45-65)	(50-60)	(55-70)	(50-60)	(45-65)	(40-70)
L80D80	L70D80	L60D80	LI D80	I60D80	170D80	180D80
65%	65 %	65%	72,5 %	65 %	65 %	65%
(50-80)	(55-75)	(60-70)	(65-80)	(60-70)	(55-75)	(50-80)

Риск суицида

L80S80	L70S80	L60S80	LI S80	160S80	170S80	180S80
20 %						
L80S70	L70S70	L60S70	LI S70	160S70	170S70	180S70
25 %	25 %	25 %	25%	25 %	25 %	25 %
L80S60	L70S60	L60S60	LI S60	160S60	170S60	180S60
30 %						
L80 SD	L70 SD	L60 SD	LI SD	160 SD	170 SD	180 SD
35%	35%	35%	40 %	35%	35%	35%
L80D60	L70D60	L60D60	LI D60	160D60	170D60	180D60
40 %	45 %	50 %	55 %	50 %	45 %	40 %
L80D70	L70D70	L60D70	LI D70	I60D70	170D70	180D70
45 %	50 %	60 %	70 %	60 %	50 %	45 %
L80D80	L70D80	L60D80	-80%	I60D80	170D80	180D80
50 %	60 %	70 %		70 %	60 %	50 %



ВКПА и ФТ: новые возможности

Впервые появилась возможность первичной профилактики самоубийств и выявления групп риска по антисоциальному и аддиктивному поведению при помощи использования в скрининговых исследованиях групп риска объективных методов визуальной психодиагностики. Необходимость анкетирования и проведения затратных по времени и средствам исследований при этом уходит на второй план.

Принципиальные подходы к скринингу

- 1. Выявление предполагаемых групп риска (ближайшее окружение самоубийцы, носители определенных субкультур, психологически неустойчивые, зависимые и девиантные лица и пр.) при помощи школьных педагогов и психологов, сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и пр.
- 2. Принцип добровольности при проведении скрининговых исследований.
- 3. Разделение обследуемых по механизму оплаты скрининга (государственное и частное финансирование).
- 4. Различие технологических подходов в зависимости от географического положения обследуемых (телемедицина).
- 5. Преемственность со всеми участниками процесса, включая специалистов по вторичной профилактике самоубийств.

Ожидаемые результаты

- Снижение количества как попыток самоубийств, так и законченных случаев суицида среди детей и подростков НСО.
- Раннее выявление лиц школьного возраста, склонных к антисоциальному, аддиктивному и суицидальному поведению.
- Выявление новых закономерностей, позволяющих усилить эффективность и доступность мероприятий по первичной профилактике самоубийств.