

Павлодарский филиал НАО Медицинского университета Семей



Астениялық синдром, эмоциональды лабильділік, соматоморфты бұзылыстар

Орындаған: Базарбай Нұржас
662топ, ЖТД

Павлодар, 2021 ж

Астениялық синдром

- астения (грек тілінен: А - болмау, стenos - күш) - бұл қалыпты жүктемеден кейін тез басталатын шаршаумен сипатталатын патологиялық жағдай.
- Клиникалық көрінісінің 4 компоненті:
 1. **Тез шаршағышық** (физикалық не психикалық)
 2. **Гиперестезия** тітіркенушілік және эмоциональді лабильділікпе
 3. **Ұйқы бұзылысы** (ұйықтаудың қиындауы)
 4. **Вегетативті бұзылыстар**: бас ауруы, тершеңдік, жүрек соғысы, бас айналуы ж/е тб

Астениялық синдром

Клинические формы (стадиялары)

- Гиперстениялық
- Тітіркенулік әлсіздік
- Гипостениялық

Этиология бойынша

- Психогенді
- Соматогенді
- Церебральді
- Физиогенді
- Адаптацияндық

Клиникалық нұсқалары

- Астено-адинамиялық
- Астено-депрессиялық
- Үрейлі-астениялық
- Астено-ипохондриалық
- Истерио-астениялық
- Астено-сенситивті


Переутомление

- Физикалық құбылыс
- Энергиялық қордың бітуінен
- Күш жұмсалудан кейін пайда болады, демалыстан кейін жоғалады
- Процесс **өтпелі**

Астениялық синдром

- Патологиялық процесс
- Энергиялық қорды пайдалану реттелуінің бұзылуынан
- Демалыстан кейін жоғалмайды
- Процесс **тұрақты**

Астенияның «порочный круг»



Эмоциональды лабильділік (тұрақсыздық)

- көңіл күйдің бірінен екіншісіне жеңіл ауысуы, тұрақсыздығы. Аффект өзгерісіне кез келген болар-болмас әсердің алып келуі. Бұл көрініс неврастенияға, соматогенді астенияға, бас миының органикалық өзгерістеріне, абстинентті жағдайларға тән.

Бордерлайн-пограничное расстройство личности

Соматоформды бұзылулар

- бұл соматикалық (дене) ауруға ұқсайтын физикалық белгілерге негізделген психогендік аурулар тобы, бірақ органдар мен жүйенің бұзылыстарын анықтау мүмкін емес. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл психологиялық проблемалардың әсерінің денеде көрінісі.

Психогенез соматоформного расстройства



Соматоформды бұзылыстардың пайда болу процесі адам өмірінің өзара байланысты үш саласына әсер етеді: биологиялық, психологиялық және әлеуметтік. Олардың бұзылуы психогендік жүйке-психикалық бұзылуларға әкеледі.

Соматоформды бұзылулардың пайда болуының «триггер механизмі» көбінесе:

- шамадан тыс жұмыс және астения, мүмкін есінен тану;
- ұйқының бұзылуы;
- жабық және тар бөлмелер;
- адамдар көп жиналатын орындар;
- жұқпалы аурулар, токсикоинфекциялар;
- жедел хирургиялық араласулар;
- алкогольді асыра пайдалану;
- гормоналды өзгерістер;
- ажырасу, босану, ауру немесе жақын адамының қайтыс болуы нәтижесінде өткір стресс.

Классификация и стадии развития соматоформного расстройства

Уровень	Наименование	Характеристика	Заболевания
Первый	Соматизация аффективного переживания	Соматические симптомы размыты, диффузны, физические причины их появления обнаружить не удаётся	<ul style="list-style-type: none"> • депрессивный эпизод • расстройство приспособительных реакций • соматоформные расстройства
Второй	Психосоматическое функциональное нарушение	Соматические синдромы не имеют под собой реального нарушения органов или систем	<ul style="list-style-type: none"> • нервная анорексия • нервная булимия • диссоциативные расстройства • энурез и энкопрез неорганической природы
Третий	Органические психосоматозы	Наличие соматической патологии с обменно-трофическими нарушениями, которые практически не поддаются лечению	<ul style="list-style-type: none"> • бронхиальная астма • язвенная болезнь • гастрит • дуоденит • экзема • дерматит • псориаз • крапивница • ревматоидный артрит и т.

- Ипохондрическое расстройство (F45.2),
- Неврастения (F48.0),
- Недифференцированное соматоформное расстройство (F45.1),
- Посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1),
- Расстройство приспособительных реакций (F43.2),
- Синдром деперсонализации-дереализации (F48.1),
- Соматизированное расстройство (F45.0),
- Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (F45.3),
- Устойчивое соматоформное болевое расстройство (F45.4)