Вычисление производных. Формулы дифференцирования

Формулы

дифференцирования:

$$(C)' = 0$$

$$(x)' = 1$$

$$(kx + m)' = k$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

Пример:

● Найти значение производной функции $y = 3x + 5$ в точке $x = 4$.

Решение:

$$(kx + m)' = k$$

$$k = 3$$

$$m =$$

$$(\quad)' =$$

$$f'(4) = 3$$

Ответ: 3.

Пример:

● Найти значение производной $y = x^2$ в точке $x = -1$.

Решение:

$$(x^2)' = 2x$$

$$f'(x) =$$

$$f'(-1) = 2 \cdot (-1) = -2$$

Ответ: -2 .

Формулы

дифференцирования:

$$(\dot{C})' = 0$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(x)' = 1$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(kx + m)' = k$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

Пример:

Найти производную $y = \sqrt{x}$ в точке $x = 4$.

Решение:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) =$$

$$f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

Ответ: $\frac{1}{4}$.

Пример:

● Найти значение производной функции $y = \cos x$ в точке $x = \frac{\pi}{6}$.

Решение:

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$f'(x) =$$

$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

Ответ: $-\frac{1}{2}$.

Правила дифференцирования

Производная суммы

$$\begin{aligned} (C)' &= 0 \\ (x)' &= 1 \\ (kx + m)' &= k \\ (x^2)' &= 2x \\ \left(\frac{1}{x}\right)' &= -\frac{1}{x^2} \end{aligned}$$

Решение:
 $(kx + m)' = k$
 $k =$
 $m =$
 $C =$
 $y' =$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$3x + 5$$

3

$(C)' = 0$
 $(x)' = 1$
 $(kx + m)' = k$
 $(x^2)' = 2x$

2. Найдем разностное отношение:

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

Найти производную $y = \sqrt{x}$ в точке $x = 4$.

Решение:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) =$$

$$f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

Ответ: $\frac{1}{4}$.

Решение:
 $y' =$
 $f(x) =$
 $f'(4) =$
 Ответ:

Лемма:

- $$\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Постоянный множитель

Найти производную, применяя формулу $(\cos x)' = -\sin x$.

Решение:

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$f'(x) =$$

$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

Производная произведения

$$- \sin x \quad \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Доказательство:

1. Приращение в точке x_0 :

$$\begin{aligned} \Delta(uv) &= u(x_0 + \Delta x)v(x_0 + \Delta x) - u(x_0)v(x_0) = \overbrace{(u(x_0 + \Delta x) - u(x_0) + u(x_0))}^{\Delta u} \times \\ &\times (v(x_0 + \Delta x) - v(x_0) + v(x_0)) - u(x_0)v(x_0) = (\Delta u + u(x_0))(\Delta v + v(x_0)) - u(x_0)v(x_0) = \\ &= \underbrace{\Delta u \cdot \Delta v}_{\Delta v} + \Delta u \cdot v(x_0) + \Delta v \cdot u(x_0) + u(x_0)v(x_0) - u(x_0)v(x_0) = \\ &= \Delta u \cdot \Delta v + \Delta u \cdot v(x_0) + \Delta v \cdot u(x_0) \end{aligned}$$

2. Вычислим разностное отношение:

$$\frac{\Delta(uv)}{\Delta x} = u(x_0) \frac{\Delta v}{\Delta x} + v(x_0) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

3. Найдем производную:

$$\begin{aligned} (uv)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(u(x_0) \frac{\Delta v}{\Delta x} + v(x_0) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) = u(x_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + v(x_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \\ &+ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = u \cdot v' + v \cdot u' + 0 \cdot v' = u' \cdot v + u \cdot v' \end{aligned}$$

Пример:

● Найти производную функции $f(x) = (5x + 1)(x - 3)$

Решение:

$$(u + v)' = u' + v' \qquad (cu)' = c \cdot u' \qquad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$u = 5x + 1$$

$$v = x - 3$$

$$u' = (5x)' + 1' = 5x' + 1' = 5 \cdot 1 + 0 = 5$$

$$v' = x' - 3' = 1 + 0 = 1$$

$$f'(x) = 5 \cdot (x - 3) + (5x + 1) \cdot 1 = 5x - 15 + 5x + 1 = 10x - 14$$

Ответ: $f'(x) = 10x - 14$.

Производная частного

Доказательство:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Выведем формулу $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

1. Найдем приращение функции $\frac{1}{v}$:

$$\Delta \left(\frac{1}{v}\right) = \frac{1}{v(x_0 + \Delta x)} - \frac{1}{v(x_0)} = \frac{-\Delta v}{v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0)} = -\frac{\Delta v}{v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0)}$$

2. Определим разностное отношение: $\frac{\Delta\left(\frac{1}{v}\right)}{\Delta x} = \frac{-\frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0)}$

3. Найдем производную функции:

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0)} = \frac{-\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x}}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0))} = -\frac{v'}{v \cdot v} = -\frac{v'}{v^2}$$

• Воспользуемся правилом нахождения производной произведения функций.

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \left(u \cdot \frac{1}{v}\right)' = u' \cdot \frac{1}{v} + u \cdot \left(\frac{1}{v}\right)' = \frac{u'}{v} + u \cdot \frac{-v'}{v^2} = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

Пример:

● Найти производную функции $F(x) = \frac{2x+1}{x+5}$.

Решение:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$u = 2x + 1 \Rightarrow u' = 2$$

$$v = x + 5 \Rightarrow v' = 1$$

$$F'(x) = \frac{2 \cdot (x + 5) - 1 \cdot (2x + 1)}{(x + 5)^2} = \frac{2x + 10 - 2x - 1}{(x + 5)^2} = \frac{9}{(x + 5)^2}$$

$$\text{Ответ: } F'(x) = \frac{9}{(x+5)^2}.$$

Докажем, что $(x^n)' = nx^{n-1}$ для любого n и $x > 0$

Известно, что $x' = 1$. Используя правило нахождения производной произведения функций, найдем производные функций:

$$(x^2)' = (x \cdot x)' = x' \cdot x + x \cdot x' = 1 \cdot x + x \cdot 1 = 2x$$

$$(x^3)' = (x^2 \cdot x)' = (x^2)' \cdot x + x^2 \cdot x' = 2x \cdot x + 1 \cdot x^2 = 3x^2$$

$$(x^4)' = (x^3 \cdot x)' = (x^3)' \cdot x + x^3 \cdot x' = 3x^2 \cdot x + 1 \cdot x^3 = 4x^3$$

Докажем, что формула $(x^n)' = nx^{n-1}$ справедлива и при других значениях n .

Метод математической индукции

$$n = k - 1, (x^{k-1})' = (k - 1)x^{k-2}$$

$$n = k, (x^k)' = (x^{k-1} \cdot x)' = (x^{k-1})' \cdot x + x^k \cdot x' = (k - 1)x^{k-2} \cdot x + x^{k-1} = k \cdot x^{k-1}$$

Пример:

● Найти производную функции $f(x) = x^3 - x^2 + x - 3$.

Решение:

$$(u + v)' = u' + v' \quad (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$f'(x) = (x^3)' - (x^2)' + x' - 3' = 3x^2 - 2x + 1$$

Ответ: $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

$$\begin{aligned}(c)' &= 0 \\ (x)' &= 1 \\ (kx + m)' &= k \\ (x^2)' &= 2x \\ (1)' &= 1\end{aligned}$$

$$(e^{kx})' = ke^{kx}$$

3

5

$3x + 5$

3

Решение:
 $(x^2)' = 2x$
 $f'(x) =$
 $f'(-1) = 2 \cdot (-1) = -2$
Ответ: -2 .

$2x$

Пример:

$$(C)' = 0$$

$$(x)' = 1$$

$$(kx + m)' = k$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

Найти значение производной функции $y = \cos x$ в точке $x = \frac{\pi}{6}$.

Решение:

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$f'(x) =$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$$

Ответ: $-\frac{1}{2}$.

Решение:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) =$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{4}$$

$$-\sin x$$

Д. Казательство:

1. Приращение в точке x_0 :

$$\Delta(uv) = u(x_0 + \Delta x)v(x_0 + \Delta x) - u(x_0)v(x_0) = (u(x_0 + \Delta x) - u(x_0) + u(x_0)) \times \\ \times (v(x_0 + \Delta x) - v(x_0) + v(x_0)) - u(x_0)v(x_0) = (\Delta u + u(x_0))(\Delta v + v(x_0)) - u(x_0)v(x_0) = \\ = \Delta u \cdot \Delta v + \Delta u \cdot v(x_0) + \Delta v \cdot u(x_0) + u(x_0)v(x_0) - u(x_0)v(x_0) = \\ = \Delta u \cdot \Delta v + \Delta u \cdot v(x_0) + \Delta v \cdot u(x_0)$$

2. Вычислим разностное отношение:

$$\frac{\Delta(uv)}{\Delta x} = u(x_0) \frac{\Delta v}{\Delta x} + v(x_0) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

3. Найдем производную:

$$(uv)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(u(x_0) \frac{\Delta v}{\Delta x} + v(x_0) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) = u(x_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + v(x_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} +$$

$$+ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} = u \cdot v' + v \cdot u' + 0 \cdot v' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

Пример:

-

Δ u

Упражнение:

Найти значение производной у = 3x + 5.
Решение:
 $(x^2)' = 2x$
 $f'(x) =$
 $f'(-1) = 2 \cdot (-1) = -2$
Ответ: -2.

$$3x + 5$$

$$(C)' = 0$$

Найти значение производной функции $y = 3x + 5$ в точке $x = 4$.
Решение:
 $(kx + m)' = k$
 $k =$
 $m =$

$$(kx + m)' = k$$

$$(x^2)' = 2x$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$3 \quad 2x$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Выведем формулу $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$:

1. Найдем приращение функции $\frac{1}{v}$:

$$\Delta(\frac{1}{v}) = \frac{1}{v(x_0 + \Delta x)} - \frac{1}{v(x_0)} = \frac{v(x_0) - v(x_0 + \Delta x)}{v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0)} = -\frac{\Delta v}{v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0)}$$

2. Определим разностное отношение: $\frac{\Delta(\frac{1}{v})}{\Delta x} = \frac{-\Delta v}{v(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0)}$

3. Найдем производную функции:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Основные правила:

$$✓ (u + v)' = u' + v'$$

$$✓ (cu)' = c \cdot u'$$

$$✓ (u \cdot v)' = u'v + uv'$$

$$✓ \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$✓ (x^n)' = nx^{n-1}$$

Производные основных функций:

•

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

Найти производную $y = \sqrt{x}$ в точке $x = 4$.

Решение:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) =$$

$$f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

Ответ: $\frac{1}{4}$.

$$(\cos x)' = -\sin x$$
$$\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

**Дифференцирование
функции $y = f(kx + m)$**

Найти значение производной функции $y = \cos x$ в точке $x = \frac{\pi}{6}$

Решение:
 $(\cos x)' = -\sin x$
 $f'(x) = -\sin x$
 $f'(\frac{\pi}{6}) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta u$$

линейная функция

Найти производную функции $f(x) = (5x + 3)(x - 3)$

Решение:
 $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
 $u = 5x + 3 \Rightarrow u' = 5$
 $v = x - 3 \Rightarrow v' = 1$
 $f'(x) = (5x + 3)' \cdot (x - 3) + (5x + 3) \cdot (x - 3)'$
 $f'(x) = 5 \cdot (x - 3) + (5x + 3) \cdot 1 = 5x - 15 + 5x + 3 = 10x - 12$

$$\Rightarrow v' = 1$$

Найти производную функции $f(x) = \sin x$

Решение:
 $(\sin x)' = \cos x$
 $f'(x) = \cos x$
 $f'(\frac{\pi}{6}) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \frac{u' \cdot v + u \cdot v'}{\Delta x} \Rightarrow u' = 2$$

линейная функция

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

дифференциальность:
 1. Приращение в точке x_0 :
 $\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (u(x_0 + \Delta x) + v(x_0 + \Delta x)) - (u(x_0) + v(x_0)) = (u(x_0 + \Delta x) - u(x_0) + v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)) = \Delta u + \Delta v$
 $\Delta f(x_0) = u(x_0) \Delta x + v(x_0) \Delta x + \Delta u \Delta x + \Delta v \Delta x$
 $\Delta f(x_0) = (u(x_0) + v(x_0)) \Delta x + \Delta u \Delta x + \Delta v \Delta x$
 2. Вынесем основное отношение:
 $\frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = (u(x_0) + v(x_0)) + \Delta u + \Delta v$
 3. Найдем производную:
 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = (u(x_0) + v(x_0)) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta v = u(x_0) + v(x_0)$

$$((kx + m)^n)' = kn(kx + m)^{n-1}$$

Докажем, что $(x^n)' = nx^{n-1}$

Известно, что $x^1 = x$. Используя правило нахождения производной произведения функций, найдем производные функций:

$$(x^2)' = (x \cdot x)' = x' \cdot x + x \cdot x' = 1 \cdot x + x \cdot 1 = 2x$$

$$(x^3)' = (x^2 \cdot x)' = (x^2)' \cdot x + x^2 \cdot x' = 2x \cdot x + 1 \cdot x^2 = 3x^2$$

$$(x^4)' = (x^3 \cdot x)' = (x^3)' \cdot x + x^3 \cdot x' = 3x^2 \cdot x + 1 \cdot x^3 = 4x^3$$

Докажем, что формула $(x^n)' = nx^{n-1}$ справедлива и при других значениях n .

Метод математической индукции

$$n = k - 1, (x^{k-1})' = (k - 1)x^{k-2}$$

$$n = k, (x^k)' = (x^{k-1} \cdot x)' = (x^{k-1})' \cdot x + x^{k-1} \cdot x' = (k - 1)x^{k-2} \cdot x + x^{k-1} = k \cdot x^{k-1}$$

для любого n и $x > 0$

Найти производную функции $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$

Решение:

$$(u + v)' = u' + v' \quad (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$f'(x) = (x^3)' - (2x^2)' + x' - 3' = 3x^2 - 2x + 1$$

Ответ: $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

$$(\cos(kx + m))' = -k \cdot \sin(kx + m)$$

$$(\operatorname{tg}(kx + m))' = \frac{k}{\cos^2(kx + m)}$$

- ✓ $(u + v)' = u' + v'$
- ✓ $(cu)' = c \cdot u'$
- ✓ $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- ✓ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
- ✓ $(x^n)' = nx^{n-1}$

Пример:

- $$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Пример:

-

Пример: $(f(kx + m))' = kf'(kx + m)$

Найти значения аргумента, удовлетворяющие условию $f'(x) = g'(x)$, если:

$$f(x) = \sin(2x - 3), g(x) = \cos(2x - 3).$$

Решение:

$$f'(x) = 2 \cos(2x - 3)$$

$$2x = 3 - \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$$

$$g'(x) = -2 \sin(2x - 3)$$

$$x = 1,5 - \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$$

=

$$\cos(2x - 3) \neq 0$$

$$\cos(2x - 3) = 0 \Rightarrow 2x - 3 = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$$

$$-1 = \operatorname{tg}(2x - 3)$$

$$2x - 3 = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$$

$$\text{Ответ: } x = 1,5 - \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z.$$

Пример:

● Найти значения аргумента, удовлетворяющие условию $f'(x) = g'(x)$, если:

$$f(x) = 2\sqrt{3x - 10}, \quad g(x) = 2\sqrt{14 + 6x}.$$

Решение:

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x - 10}}$$

$$g'(x) = \frac{3}{\sqrt{14 + 6x}}$$

$$\text{ОДЗ: } 3x - 10 > 0, \quad 14 + 6x > 0$$

$$3x > 10, \quad 6x > -14$$

$$x > 3\frac{1}{3}, \quad x > -2\frac{1}{3}$$

$$x > 3\frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{3x - 10} = \sqrt{14 + 6x} \Leftrightarrow 4(3x - 10) = 14 + 6x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 12x - 40 = 14 + 6x \Leftrightarrow 6x = 54 \Leftrightarrow x = 9$$

Ответ: $x = 9$.