

Презентация по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» Тема :Ларингит.

Выполнила студентка 4 курса ФВМ 8 группа
Чумаченко Юлия.

Преподаватель :Доцент Абрамов П.Н

Ларингит – LARYNGITIS

Болезнь возникает вследствие воспаления слизистой оболочки гортани и нередко прилегающих органов-и носа, глотки и трахеи.



По происхождению

```
graph TD; A([По происхождению]) --> B[Первичный]; A --> C[Вторичный];
```

Первичный

Первичный ларингит развивается при воздействии на слизистую оболочку различных микроорганизмов:

1. Аденовироз («вольерный кашель»)
2. Чума плотоядных (легочная форма)
3. Микоплазмоз
4. Кальцивироз кошек
5. Ринотрахеит кошек

Вторичный

Вторичный ларингит может развиваться при воздействии на гортань различных раздражителей:

1. Аллергический ларингит
2. Вдыхание токсических паров и дыма.
3. Породная предрасположенность
4. Длительный лай.
5. Регургитация с аспирацией содержимого желудка.

По течению:

-острый

-хронический

Острый ларингит обычно оканчивается выздоровлением при своевременном лечении и устранении причин заболевания.

Хронический ларингит протекает длительно и может давать рецидивы болезни при резкой смене погоды.

По характеру воспалительного процесса:

-катаральный

-крупозный

Катаральный- ларингит наблюдают обычно при нарушении правил зоогигиены и кормления животных (поение ледяной водой разгоряченных лошадей, скармливание свиньям неостывшего горячего корма, вдыхание пыльного воздуха и раздражающих газов). Часто массовые ларингиты и ларинготрахеиты телят на специализированных фермах и промышленных комплексах возникают при поении слишком холодной водой из автопоилок и содержании в теплых помещениях. Причиной массового заболевания может быть и резкий перевод откормочных животных на кормление отходами спирто-пивоваренных предприятий. Ларингит появляется и при неумелом насильственном задавании через рот лекарственных препаратов, раздражении слизистой гортани во время зондирования пищевода, его могут вызвать также и застрявшие в просвете гортани инородные предметы.

Крупозный ларингит-возникает вследствие воздействия на слизистую гортани сильных раздражителей -(вдыхание дезинфицирующих средств, аммиака, кислот, щелочей, дыма, вдыхание холодного воздуха разгоряченными животными и др.). Предрасположены к заболеванию животные изнеженные, постоянно содержащиеся в тепле и не пользующиеся моционом. Способствующий фактор: недостаток в рационе витамина А.

ЭТИОЛОГИЯ

- Первичные ларингиты :
 - нарушение правил зоогигиены и кормления ЖИВОТНЫХ
 - неумелое введение лекарственных препаратов, проведение зондирования.
- Вторичные ларингиты:
 - инфекционные болезни
 - переход воспаления с др . органов

Патогенез развития болезни.


- 1.Этиологический фактор
- Воспаление
- Набухание слизистой оболочки
- Накопление экссудата
- Сужение её просвета
- Затрудненное дыхание
- Интоксикация организма

СИМПТОМЫ.

- Состояние животного удовлетворительное, температура в норме, или иногда повышена.
- Кашель
- Животное вытягивает шею и наклоняет голову
- При аускультации хрипы и шумы стеноза гортани
- При крупозной форме обычно повышается местная и общая температура.
- Нижнечелюстные и заглоточные лимфатические узлы болезненны и увеличены
- у коров может снижаться или прекращаться лактация
- Собаки и кошки часто вытягивают шею, наклоняют голову. Периодически возникающий резкий приступ сухого кашля заканчивается рвотой. Пальпация области гортани обычно сопровождается болезненностью и кашлем. Часто повышается общая температура тела на 0,5-1С. Аппетит, как правило, понижен.

Патоморфологические изменения .

- Катаральная форма болезни:
 - Гиперемия слизистой оболочки
 - Изъязвления и припухлость
 - Слизистая надгортанного и черпаловидных хрящей, голосовых связок сильно покрасневшая, отечная, местами эрозирована, иногда с кровоизлияниями

- 
- При крупозном ларингите
 - Отложения фибринозного экссудата в форме пленок
 - Слизистая оболочка выглядит гиперемированной, геморрагичной , набухшей и нередко гнойно инфильтрированной

Диагноз

- Стравиться на основании анамнеза, клинических и других методов исследований. Симптомом является кашель, чувствительность гортани при пальпации и отсутствие или незначительные отклонения в общем состоянии животного. Важен визуальный осмотр и ларингоскопия.

Ларингоскопия гортани при воспалении



Лечение

- Устраняют причины
- Применяют теплые укутывания области гортани или прогревания
- Аутогемотерапия
- Внутрь назначают отхаркивающие и рассасывающие препараты 2-3 раза в день
- При болезненном и сильном кашле животным назначают промедол разных видов в соответствующих дозах
- Показаны ингаляции теплых водяных паров
- Больным крупозным ларингитом назначают антибиотики или сульфаниламидные препараты



Рис. 71. Фиксация согревающих компрессов в области гортани

Рис. 12. Укрепление припарок и согревающих компрессов в области глотки и гортани.




Рис. 112
Риноларингоскоп




Рис. 113
Ингаляционный
аппарат для лошади

Профилактика

Состоит в недопущении причин, вызывающих ларингит. Для этого соблюдают технологию содержания и кормления животных, предохраняют их от простуды, не допускают поение ледяной водой, кормления холодными кормами, попадания животных в атмосферу раздражающих газов, пыли, горячего воздуха и др.

Спасибо за внимание !

