

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ


С.В. Новосельцев, D.O.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Остеопатическое поражение черепных нервов – это поражение нервов на уровне контакта с костями, мембранами и жидкостями. К истинным же поражениям черепных нервов относятся травматические и воспалительные поражения.

Данное исследование основано на системном анализе современной специальной литературы за последние 30 лет.

МЕСТА ВЫХОДА ИЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА ДВЕНАДЦАТИ ПАР КРАНИАЛЬНЫХ НЕРВОВ И ИХ ФУНКЦИИ



Все нервы имеют различное специфическое функциональное значение:
 (чувствительные - CN I, II, VIII;
 двигательные - CN III, IV, VI, XI, XII;
 смешанные - CN V, VII, IX, X)

Краниальные нервы

- Краниальный нерв содержит от 50 до 90% соединительной ткани.
- Эндоневрий – между нервными волокнами
- Периневрий – вокруг пучков нервных волокон
- Эпиневрий – наружная оболочка нерва


- Для фасций характерны поражения:
 - натяжения;
 - деформации;
 - фиброз.

- В случае краниального нерва фасциальное напряжение приводит к повышению внутринеурального давления и, как следствие, постоянной патологической активности нерва.

ЯДРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ В СТВОЛЕ МОЗГА


Двигательные ядра черепных нервов расположены более медиально, а чувствительные – латеральнее

Вид сверху и сзади



- Эфферентные (двигательные) волокна
- Афферентные (чувствительные) волокна
- Смешанные (двигательные и чувствительные) волокна


ВЫХОД КРАНИАЛЬНЫХ НЕРВОВ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ВНУТРЕННЕГО ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА



После изучения путей прохождения для каждого черепного нерва выделены зоны остеопатических поражений


Путь прохождения обонятельного нерва

- 20 пучков безмиелиновых аксонов обонятельных нейронов на слизистой верхней носовой раковины и верхней 1/3 носовой перегородки (**1** нейрон)
- Обонятельные луковицы (**2** нейрон)
- Подкорковые обонятельные анализаторы (trigonum olfactorii, substantia perforata anterior, septum pellucidum) (**3** нейрон)
- Кортикальный конец анализатора = извилина гиппокампа и аммонов рог





ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ОБОНЯТЕЛЬНОГО НЕРВА

- Продырявленная пластинка решетчатой кости натяжение твердой мозговой оболочки.
- Лобно-решетчатый шов.
- Клиновидно-решетчатый шов.
- Нарушение циркуляции ликвора на уровне боковых и третьего желудочков мозга может привести к нарушению кинетики на уровне прозрачной перегородки и функции на уровне третьего нейрона




Путь прохождения зрительного нерва

- **Палочки и колбочки** (130 млн.) – нейроэпителиальные образования в сетчатке глаза (**1** нейрон)
- **Биполярные клетки** (**2** нейрон) – более глубокие слои сетчатки. Их аксоны формируют диск зрительного нерва
- **Зрительный канал** – в полость черепа
- **Хиазма** (перекрест волокон от внутренних половин сетчаток = информация о наружных полях зрения, неперекрещенная часть – аксоны от наружных половин сетчаток)
- **Зрительные тракты** к латеральным коленчатым телам и подушке зрительного бугра (а также к передним буграм четверохолмия – первое звено рефл. дуги реакции на свет)
- От наружных коленчатых тел через заднее бедро внутренней капсулы и в составе п. Грасолье (radiatio optica) заканчиваются в **шпорной борозде**, клине и язычной извилине.






Зрительный нерв (nervus opticus)




Строение сетчатки (схема)

- A - амакрийные клетки
- B - биполярные нейроны
- C - колбочки
- G - ганглионарные нейроны
- H - горизонтальные клетки
- P - пигментные клетки
- R - палочки



Проекция в левой затылочной доле

Проекция в правой затылочной доле





ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА


- **Внутриорбитальная часть** – вследствие натяжения ТМО и нарушения циркуляции ликвора, а также при изменении тонуса глазодвигательных мышц.
- **Внутриканальная часть** – вследствие натяжения внутреннего сухожилия кольца Зинна.
- **Внутричерепная часть** в области зрительного перекреста – вследствие натяжения медиальных волокон палатки мозжечка – диафрагмы турецкого седла.

Путь прохождения глазодвигательного нерва



- Ядра располагаются на дне сильвиева водопровода на уровне **передних** бугров четверохолмия и составляют 5 клеточных групп:
 - Два наружных крупноклеточных (m. levator palpebrae superioris, m. rectus superior, m. rectus internus, m. obliquus inferior, m. rectus inferior)
 - Два мелкоклеточных ядра (Якубовича) (парасимпатические, связаны с m. sphincter pupillae через цилиарный ганглий)
 - Одно внутреннее мелкоклеточное (Перлеа) (парасимпатическое, связано с m. ciliaris через цилиарный ганглий)
- Выход из мозга на границе моста и ножек с внутренней стороны последних
- Кавернозный синус (сверху, изнутри кнаружи)
- Верхняя глазничная щель






Путь прохождения CN III, IV, VI через кавернозный синус




D'après Ho




Кольцо Zinn`а



ОБЩАЯ ЗОНА
ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО
КОНФЛИКТА ДЛЯ СN III, IV, VI
НЕРВОВ – *ВЕРХНЯЯ*
ГЛАЗНИЧНАЯ ЩЕЛЬ






ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВА

- Контакт со спинкой турецкого седла (при паттернах СБС)
- Крыша кавернозного синуса.
- Латеральная стенка кавернозного синуса.
- Передняя стенка кавернозного синуса.
- Кольцо Зинна.

Путь прохождения блокового нерва

- Ядро располагается на дне сильвиева водопровода на уровне **задних** бугров четверохолмия
- Волокна направляются вверх, огибают сильвиев водопровод и после перекреста выходят не на основании мозга, а дорсальнее.
- Кавернозный синус
- Верхняя глазная щель к m. trochlearis




ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ БЛОКОВОГО НЕРВА

- Ликвородинамика на уровне сильвиевого водопровода
- Место перфорации крыши кавернозного синуса.
- Латеральная стенка кавернозного синуса.
- Передняя стенка кавернозного синуса.


Путь прохождения отводящего нерва

- Ядро расположено в варолиевом мосту на дне ромбовидной ямки
- Корешки нерва выходят на границе моста и продолговатого мозга на уровне пирамид
- Кавернозный синус
- Верхняя глазничная щель (к m. rectus externus)




ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ОТВОДЯЩЕГО НЕРВА

- Петро-базиллярный синдесмоз
- Бороздка на вершукпе пирамиды
- Связка Грубера
- Задняя стенка кавернозного синуса
- Верхняя глазничная щель
- Кольцо Зинна




Путь прохождения тройничного нерва

- Чувствительные волокна начинаются из Гассерова узла. Аксоны клеток узла - чувствительный корешок, который входит в мост около средних ножек мозжечка. Дендриты - чувствительные волокна трех ветвей CN V.
- Двигательное ядро расположено в дорсолатеральном отделе покрышки моста. Выходят волокна тонким корешком и присоединяются к CN V3.




Гассеров ганглий

- Гассеров ганглий окружен раздвоением dura mater – полость Меккеля, не имеет соприкосновения с пирамидой височной кости.
- Полость Меккеля тесно контактирует с задне-нижним латеральным углом кавернозного синуса.





Путь прохождения тройничного нерва

- Глазной нерв (CN V1): гассеров ганглий, кавернозный синус, верхняя глазная щель, делится на 3 ветви – лобный, слезный и носоресничный.
- CN V1 иннервирует: кожу лба, передней волосистой части головы, верхнего века, внутреннего угла глаза и спинки носа, глазное яблоко, слизистые верхней части носовой полости, лобную и решетчатые пазухи, dura mater.



Путь прохождения тройничного нерва


- Верхнечелюстной нерв (CN V2):
 - гассеров ганглий,
 - нижняя часть латеральной стенки кавернозного синуса,
 - круглое отверстие,
 - крыловидно-небная ямка (здесь ветви: подглазничный, скуловой нервы и ветви к крылонебному ганглию)



Крылонебный ганглий


● Границы крыловидно-небной ямки:

- Спереди – бугристость верхней челюсти;
- Сверху – нижняя пов-ть б. крыла и тело клиновидной кости;
- Сзади – крыловидный отросток клиновидной кости;
- Медиально – перпендикулярная пластинка небной кости;
- Латерально – крыловидно-верхнечелюстная щель, заполненная соединит. тканью




Крылонебный ганглий

- Парасимпатическая часть: большой поверхностный каменистый нерв (CN VII), CN V2, малый каменистый нерв (CN IX)
- Симпатическая часть: глубокий каменистый нерв (симп. сплет. а. carotis)



Зоны иннервации крылонебного ганглия

- глазница;
- слизистая носа;
- носоглотка;
- мягкое и твердое небо;
- миндалины;
- слезные железы;
- десны верхней челюсти



Путь прохождения тройничного нерва

● Нижнечелюстной нерв (CN V3):


- гассеров ганглий;
- овальное отверстие

Отдает следующие **двигательные ветви**:

- жевательный нерв;
- глубокие височные нервы;
- латеральные и медиальные крыловидные нервы;
- нерв мышцы, напрягающей небную занавеску;
- нерв мышцы, напрягающей барабанную перепонку



Отдает следующие **чувствительные ветви**:

- менингеальная ветвь;
- щечный нерв;
- ушно-височный нерв;
- язычный нерв (смешанный)



Путь прохождения тройничного нерва

- Язычный нерв проходит между латеральной и медиальной крыловидными мышцами, идет по внутренней поверхности нижней челюсти и вступает в нижнюю часть языка
- Нерв проводит общую чувствительность от передних 2/3 языка, слизистой нижней части полости рта, передних отделов нижней десны, небно-язычной дужки и небной миндалины. Частично иннервирует слюнную железу.



ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Глазной нерв

- Гассеров ганглий
- Латеральная стенка кавернозного синуса
- Верхняя глазничная щель
- Лобно-решетчатый шов для переднего решетчатого нерва


Верхнечелюстной нерв

- Полость Меккеля
- Круглое отверстие
- крыловидно-верхнечелюстная фасетка глазничного отростка небной кости
- Дисфункции верхней челюсти и скуловерхнечелюстной шов
- Повреждение на уровне клыковой ямки

Нижнечелюстной нерв


- Гассеров ганглий
- Овальное отверстие
- Крыловидные мышцы

Тройничный нерв (*n. trigeminus*)






Путь прохождения лицевого нерва

- Ядро расположено глубоко в нижнем отделе варолиева моста, рядом с CN V и CN VI.
- Волокна поднимаются дорсально ко дну ромбовидной ямки, огибают CN VI и образуют **коленце** на уровне передней стенки пирамиды.
- Далее волокна идут вниз и выходят корешком в мостомозжечковом углу вместе с CN VII и CN VIII, следуя в направлении внутреннего слухового отверстия.



Путь прохождения лицевого нерва


- Во внутреннем слуховом проходе CN VII, CN VII', CN VIII уплотняются и образуют акустическо-лицевую ножку.






Путь прохождения лицевого нерва

Другие ветви:


- стременной нерв;
- chorda tympani;
- соединительная ветвь с барабанным сплетением



Видиев нерв и крыловидный канал




Путь прохождения лицевого нерва




Projection externe:

au sinus latéral
du VII
de l'antre




Projection horizont.:

de l'antre } en position
du sinus lat. } habituelle
d'un antre petit
d'un sinus procident




Projection frontale:

du CAE
de la coisse
du VII



Лицевой нерв (n. facialis)

См. также рис. 19, 153



ЗОНЫ ОСТЕПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Внутренний слуховой проход

Выход большого поверхностного каменистого и глубокого каменистого нервов


Рваное отверстие

Видиев канал

Шилососцевидное отверстие

Путь прохождения преддверно-улиткового нерва

- Преддверно-улитковый нерв состоит из 2-х частей: преддверного (верхнего) и улиткового (нижнего) корешков (VIII) корешков
- Оба начинаются во внутреннем ухе, проходят во внутреннем слуховом канале и отверстию, выходят из пирамиды и входят в мозг латеральнее CN VII



Преддверно-улитковый нерв

- Преддверный нерв – проводит импульсы от статического аппарата преддверия и полукружных каналов
- Улитковый нерв- проводит слуховые импульсы от кортиева органа, находящегося в улитке внутреннего уха
- *Улитковый корешок* начинается в улитковом узле, заканчивается в заднем и переднем улитковых ядрах на границе моста и продолговатого мозга
- Из **переднего ядра** волокна идут в 2-х направлениях. Большая часть следует к верхним оливам своей и противоположной сторон = **трапециевидное тело**
- Из оливы противоположной стороны начинается новая система слуховых волокон – **латеральная петля**, идущая к нижним буграм четверохолмия и медиальным коленчатым телам. Из последних волокна идут через заднее бедро внутренней капсулы к извилине Гешля
- Меньшая часть волокон переднего ядра идут в одноименное полушарие мозга
- Из **заднего ядра** волокна идут по дну V4, образуя слуховые полоски

Преддверно-улитковый нерв

- *Преддверный корешок* начинается в преддверном узле. Связывает полукружные каналы с преддверными ядрами в каудальных отделах моста и оральных отделах продолговатого мозга
- Ядра имеют связи с мозжечком, спинным мозгом, задним продольным пучком, ядрами глазодвигательных нервов, красными ядрами и таламусом

ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА СN VIII:



- ВИСОЧНАЯ КОСТЬ
- ВНУТРЕННЕЕ СЛУХОВОЕ ОТВЕРСТИЕ
- DURA MATER

Путь прохождения языкоглоточного нерва

- **Чувствительное ядро** (nucl. tractus solitarii) – общее с CN X и CN VII` расположено в дорсальном отделе продолговатого мозга
- К ядру подходят аксоны gangl. superius et inferius. Периферические отростки имеют рецепторы в слизистой оболочке задней 1/3 языка, барабанной полости, евстахиевой трубы, ячеек сосцевидного отростка, в каротидном синусе и гломусе
- От ядра отходят волокна к ядрам таламуса противоположной стороны. Оттуда аксоны проходят через заднюю 1/3 задней ножки внутренней капсулы к корковому вкусовому центру в нижнем отделе постцентральной извилины
- **Двигательное ядро** (nucl. ambiguus) – расположено в сетчатой формации продолговатого мозга. Задняя часть относится к CN X, а передняя к CN IX и иннервирует шилоглоточную мышцу
- **Парасимпатические волокна** начинаются от слюноотделительного ядра ретикулярной формации продолговатого мозга

Языкоглоточный нерв (n. glossopharyngeus)

— Эфферентные волокна
 — Афферентные волокна
 - - - Парасимпатические волокна



ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ЯЗЫКОГЛОТОЧНОГО НЕРВА


- Яремное отверстие
- Пирамида височной кости
- Отверстие Анольда

Путь прохождения блуждающего нерва

- **Двигательные волокна** для мышц мягкого неба, глотки и гортани – nucl. ambiguus, а для внутренних органов – из nucl. dorsalis n. vagi
- **Чувствительные волокна** формируются отростками верхнего и нижнего чувствительных ганглиев, аксоны которого подходят к ядру одиночного пучка. Далее в таламус и корковой зоне глотки и гортани (нижний отдел задней центральной извилины)

Ветви блуждающего нерва

- **Головной отдел** - от продолговатого мозга до верхнего узла, в его пределах имеется 2 ветви
 - Менингеальная ветвь
 - Ушная ветвь
- **Шейный отдел** - от нижнего шейного узла до верхней грудной апертуры:
 - *Глоточные ветви.* Двигательные ветви из этого сплетения иннервируют констрикторы глотки, а также мышцы мягкого неба – за исключением *m. tensor veli palatini* (CN V3)
 - *Верхние шейные сердечные ветви* участвуют в образовании сердечного сплетения
 - *Верхний гортанный нерв*
- **Грудной отдел** - соответствует по протяженности заднему средостению:
 - *Возвратно-гортанный нерв*
- *Трахейные и бронхиальные ветви* - формируют легочное сплетение
- *Грудные сердечные ветви* формируют сердечные сплетения
- *Пищеводные ветви*



- 1 – верхний узел;
- 2 – нижний узел;
- 3 – менингеальная ветвь;
- 4 – яремное отверстие;
- 5 – ушная ветвь;
- 6 – ветви для иннервации горла, легких, сердца, внутренних органов.


Ветви блуждающего нерва

- **Брюшной отдел** - ниже пищеводного отдела диафрагмы. Он представлен передним и задним стволами блуждающего нерва, который выходит из пищеводного сплетения
 - **Передний блуждающий ствол** – от него отходят ветви к желудку и печени.
 - От **заднего блуждающего ствола** начинаются чревные ветви, которые идут вниз назад и достигают узлов чревного сплетения, проходя транзитом, и по сосудам направляются к органам: печени, селезенки, поджелудочной железе, почке, тонкой и толстой кишке (до левого изгиба ободочной кишки). В указанных органах формируется нервные сплетения.
 - Парасимпатический компонент блуждающего нерва на всем протяжении до органа представлен преганглионарными волокнами. В органах находятся интрамуральные вегетативные узлы, от которых идут короткие постганглионарные волокна.

ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА

- Яремное отверстие
- Верхняя грудная апертюра
- Грудная диафрагма

Блуждающий нерв (n. vagus)




Путь прохождения добавочного нерва


● **Добавочный нерв** имеет двойное происхождение: **черепное** (бульбарная часть) и **шейное** (спинномозговая часть). Черепные корешки выходят из задней латеральной борозды продолговатого мозга. Шейные спинномозговые корешки поднимаются вдоль спинного мозга на уровне С1-С6. В подпаутинном пространстве ствол добавочного нерва направляется к яремному отверстию, где делится на две ветви: **внутреннюю и наружную**.

● **Внутренняя ветвь** присоединяется к блуждающему нерву и в дальнейшем в виде нижнегортанного нерва - иннервирует мышцы гортани.

● **Наружная ветвь** выходит из яремного отверстия, идет между *a. carotis int.* и *v. jugularis int.*, а затем, подойдя под заднее брюшко *m. digastricus*, направляется к *m. SCM*. Отдав ей часть ветвей, наружная ветвь появляется у заднего края этой мышцы и далее следует к *m. trapezius*



Добавочный нерв (n. accessorius)




ЗОНЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ДОБАВОЧНОГО НЕРВА


- Большое затылочное отверстие
- Яремное отверстие

Путь прохождения подъязычного нерва

- Двигательное ядро располагается на дне ромбовидной ямки
- Из мозга нерв выходит между пирамидой и оливой 10-12 корешками. Волокна идут к подъязычному каналу, где уплотняясь, образуют нерв, покидают череп и погружаются в толщу мышц языка
- Анастомозирует с ветвью шейного сплетения (ш. петля) и иннервирует подподъязычные мышцы
- Имеет очень плотный контакт с dura mater
- Внутреннее отверстие канала CN XII имеет связь с задней менингеальной артерией




Канал подъязычного нерва



ЗОНА ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА

- Мыщелковый канал подъязычного нерва

Подъязычный нерв (n. hypoglossus)



В основе техник коррекции остеопатических поражений черепных нервов лежат следующие принципы:

- визуализация;*
- аккумуляция натяжений;*
- уравнивание непрямым методом.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема патологии черепных нервов, несмотря на углубленные исследования, до сих пор не потеряла своей актуальности. В некоторой степени число заболеваний, связанных с дисфункцией краниальных нервов даже возрастает. Остается значимой проблема прозопалгий, среди которых основное место занимает тригеминальная невралгия.

Различные механические ограничения, которые возникают вследствие родовых травм, а также проблемы пре- и постнатального периода во многом изначально обуславливают остеопатическое поражение. Поэтому, работа педиатров, терапевтов и других узких специалистов не будет в высокой степени эффективной, если пренебрегать остеопатическим осмотром ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение путей прохождения черепных нервов, их анатомо-функциональных взаимосвязей, а также специфических для каждого нерва зон остеопатического поражения, позволяет по-новому взглянуть на этиологию и патогенез периферических краниальных нейропатий.

Описанные в работе техники разработаны в соответствии с современным понятием о соматической дисфункции и направлены на устранение остеопатического поражения.

