

Гипогликемиялық синдром және кома

ҚД кезіндегі комалардың патогенезі

Гипогликемиялық кома

**Глюкозаның бірден күрт төмендеуі
нәтижесінде бас мидың оттегімен
қамтасыз етілуінің жетіспеушілігі**

Клиникасы

Белгілері	Гипогликемиялық кома
Аурудың дамуы	тез
Этиологи ясы	Инсулинді артық мөлшерде қолдану, физикалық куштеме, алкоголь
Кома алдындағы жағдай	Психомоторлы қозу

Клиникасы

Белгілері	Гипогликемиялық кома
Тынысы	қалыпты
Ацетон иісі	Анықталмайды
Тері жағдайы	Ылғалды
Көз алмасы тонусы	Қалыпты

Клиникасы

Құрысу	Болады
Сіңірлер рефлексі	Жоғары
Дене темпратурасы	Төмен
АҚҚ	Қалыпты

Клиникасы

Пульс	Қалыпты
Іші	Қалыпты
ҚЖА	Қалыпты
ЗЖА	Қалыпты

Клиникасы

Зәрдегі ацетон	—
Гликемия	Гипогликемия
Қандағы бикорбанат	Қалыпты
Қандағы мочевина	Қалыпты

ҚД кезіндегі комалардың диф.диагнозы

Қандағы натрий	Қалыпты
Қандағы калий	Қалыпты

Гипогликемиялық кома кезіндегі жедел көмек

Глюкозамен емдеу

60% 40мл глюкоза ерітіндісін күре тамырға енгізу, оны әр минут сайын қайталап отыру қажет

Егер естен тану ұзаққа созылса ми ісінуіне қарсы шаралар жүргізу

-Маннитол 15-20% 0,5-1,0г/кг күре тамырға