



ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Развитие понятия о числе

Число — единица счёта, выражающая количество, а **цифра** — знак (символ), обозначающий значение числа.

НАТУРАЛЬНЫЕ - числа, возникающие естественным образом при счёте.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ - числа, которые можно представить в виде обыкновенной дроби

ЧИСЛА

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ - числа, которые не являются рациональным, то есть не может быть представлено в виде обыкновенной дроби может быть представлено в виде бесконечной непериодической десятичной дроби.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – совокупность всех предыдущих определений

ТЕСТ



Перейди по ссылке и пройди
тест:

Множества

Множеством называют набор объектов, обладающие общим для всех характеристическими свойствами. Множество задается либо перечислением всех его элементов либо указанием некоторого свойства, такого, что все его элементы множества обладают этим свойством. Так же следует помнить, что любое множество A может содержать подмножество B , или находиться в подмножестве множества C .



Основные математические обозначения

\in - принадлежность

\notin - не принадлежит

$=$ - равенство

$\{ \}$ - множество элементов

$\{ | \}$ - множество элементов, удовлетворяющие условию

\emptyset - пустое множество

\subset - подмножество

\cup - объединение множеств

\cap - пересечение множеств

\setminus - разность множеств

\rightarrow - отображение

$||$ - абсолютная величина (модуль)

\sum - знак суммы

$!$ - факториал

\Rightarrow - знак импликации (логического следствия)

\Leftrightarrow - знак эквивалентности (логическое равенство)

\wedge - знак конъюнкции (логического «И»)

\vee - знак дизъюнкции (логического «ИЛИ»)

\neg - знак отрицания


\forall - знак всеобщности

\exists - знак существования


Операции над множествами




Множество **A**, в котором может содержаться элемент **a**:
 $a \in A; a \in A$



Пересечение множеств **A** и **B** (то есть пересечение тех элементов которые являются одновременно элементами обоих множеств):
 $A \cap B$



Объединение множеств **A** и **B** (элементы этих множеств принадлежат хотя бы одному из данных множеств):
 $A \cup B$



Разность множеств **A** и **B** (элементы множества **A** не принадлежат множеству **B**):
 $A \setminus B$

Числовые множества

Приняты следующие обозначения числовых множеств:

$$N = \{1; 2; 3; \dots; n; \dots\}$$

$$Z = \{0; \pm 1; \pm 2; \dots; \pm n; \dots\}$$

$$Q = \left\{ \frac{m}{n} : m \in Z; n \in N \right\}$$

R – множество вещественных (действительных) чисел.

Практические задания:

1. Дано некоторое множество, состоящее из трех элементов: $A = \{a, b, c\}$. Найдите все его подмножества.

Решение:

1. Это пустое множество (\emptyset);
2. Множество , содержащее по одному элементу: $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$.
3. Множество, содержащее два элемента: $\{a, b\}$, $\{b, c\}$, $\{a, c\}$.
4. Множество, содержащее три элемента: $\{a, b, c\}$.

Практические задания:

2. Дано: а) $A, B \in Z$, $A = \{1, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{2, 4, 5, 10\}$; б) $A, B \in R$, $A = [-3, 3)$, $B = (2; 10]$. Найти: $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$

Решение:

$$\text{а) } A \cap B = \{4, 5\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 9, 10\}, \quad A \setminus B = \{1, 3, 9\}, \quad B \setminus A = \{2, 10\}$$

$$\text{б) } A \cap B = (2, 3), \quad A \cup B = [-3, 10], \quad A \setminus B = [-3, 2], \quad B \setminus A = [3, 10]$$

Практические задания:

3. Пусть A – множество различных букв в слове «математика», а B – множество различных букв в слове «стереометрия». Найдите пересечение и объединение множеств A и B .

Решение:

$$A = \{м, а, т, е, и, к\} ;$$

$$B = \{с, т, е, р, о, м, и, я\}.$$

$$A \cap B = \{м, т, е, и\} ;$$

$$A \cup B = \{м, а, т, е, и, к, с, р, о, я\}$$

.

ДЕЙСТВИЯ НАД ЧИСЛАМИ

1. **Сложение.** Это действие состоит в том, что по нескольким числам, называемым слагаемыми, находится число, называемое их суммой.
2. **Вычитание** – действие, посредством которого по данной сумме (уменьшаемое) и данному слагаемому (вычитаемое) находят искомое слагаемое (разность). Это действие обратное сложению.
3. **Умножение.** Умножить некоторое число (множимое) на целое число (множитель) – значит повторить множимое слагаемым столько раз, сколько единиц содержится в множителе. Результат умножения называется произведением.
4. **Деление.** Посредством деления по данному произведению (делимое) и данному сомножителю (делитель) находят искомый сомножитель (частное). Это действие обратное умножению.
5. **Возведение в степень.** Возвести некоторое число в целую степень (во вторую, в третью и т.д.) – значит взять это число сомножителем два, три раза и т.д. Иначе говоря, возведение в степень выполняется повторным умножением.
6. **Извлечение корня** есть действие, посредством которого по данной степени (подкоренное число) и данному показателю степени (показатель корня) находят искомое основание (корень).

ТЕСТ



Перейди по ссылке и пройди тест:

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА – ЧИСЛА, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЧЕТА

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА –
ЧИСЛА, ДЕЛЮЩИЕСЯ
НА САМИХ СЕБЯ И НА
ЕДИНИЦУ

ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА –
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ

ОБЩИЙ ВИД ПРОСТОГО ЧИСЛА: $P = 2 \cdot k + 1$, где p - простое число, больше или равное трем.

1. Два *натуральных числа* называются **взаимно простыми**, если они не имеют общих делателей, кроме единицы;
2. Если взять два взаимно простых числа m и n и если число k делиться на каждое из них, то оно делиться на их произведение (верно и обратное);
3. Произведение натуральных чисел делится на простое число тогда и только тогда, когда хотя бы одно из них делится на это простое число;
4. Простых чисел бесконечно много (не существует самого большого простого числа);
5. Если натуральное число не делится ни на одно простое число, квадрат которого не превосходит это натуральное число, то оно само является простым.

НЕМНОГО О ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ

▶ Всякое целое число можно представить в виде: **$n = m \cdot k + r$**

это утверждение в более обширном своем представлении выглядит для всех натуральных чисел в виде:

$$n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0} = 10^k \cdot a_k + 10^{k-1} \cdot a_{k-1} + \dots + 10^1 \cdot a_1 + 10^0 \cdot a_0$$

где $m, n \in \mathbb{Z}; k, r \in \mathbb{N}$

ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ:

1. Число делится на 2 тогда и только тогда, когда его последняя цифра является четной, т.е. также делится на два;
2. Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма всех его цифр, также, делится на три;
3. Число делится на 4 тогда и только тогда, когда сумма удвоенной цифры в разряде его десятков и цифры в разряде единиц, также, делится на четыре (ПРИМЕР: 64 – делится на 4, т.к. $6 \cdot 2 + 4 = 16$, а $16 : 4 = 4$);
4. Число делится на 5 тогда и только тогда, когда его последняя цифра – это 0 или 5;
5. Число делится на 6 тогда и только тогда, когда он одновременно кратно и двум, и трем;
6. Число делится на 7 тогда и только тогда, когда сумма утроенного числа его десятков и цифры в разряде единиц, также, делится на семь.(ПРИМЕР: 91 – делится на 7, т.к. $9 \cdot 3 + 1 = 28$, а $28 : 7 = 4$);
7. Число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма всех его цифр, также, делится на девять.

ТЕСТ

Перейди по ссылке и пройди тест



НОД И НОК

НОД (наибольший общий делитель) есть наибольшее число, делящееся на каждое из данных чисел;

НОК (наименьшее общее кратное) есть наименьшее число, делящееся на каждое из данных чисел.

Для нахождения НОД требуется разложить несколько представленных чисел на множители простых множители и найти произведение общих множителей из разложенных этих чисел. А для определения НОК требуется разложить представленные числа на простые множители и найти произведение большего числа на множители из разложения меньшего числа, которых нет в разложении большего числа.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Рациональные числа – это множество, состоящее из натуральных чисел и рациональных дробей.

Натуральные числа a и b записанные в виде $\frac{a}{b}$ называются обыкновенными дробями, над которыми можно производить следующие арифметические действия:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}; \quad \frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm c \cdot b}{b \cdot d}; \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}; \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Виды дробей

```
graph TD; A[Виды дробей] --> B[Обыкновенные дроби: 1. Правильные 2. Неправильные 3. Смешанные 4. Составные (многоэтажные)]; A --> C[Десятичные дроби: 1. Периодические 2. Непериодические];
```

Обыкновенные дроби:

1. Правильные
2. Неправильные
3. Смешанные
4. Составные (многоэтажные)

Десятичные дроби:

1. Периодические
2. Непериодические

▶ Всякая периодическая десятичная дробь равна обыкновенной дроби, составленной по правилу: числитель равен разности между числом, стоящим до второго периода, и числом, стоящим до первого периода; знаменатель равен числу, стоящему из столько девяток, сколько цифр в периоде, и столько нулей, сколько цифр содержится между запятой и первым периодом.

$$0,(15) = \frac{15-0}{99} = \frac{15}{99} = \frac{5}{33}$$

$$0,2(13) = \frac{213-2}{990} = \frac{211}{990}$$

$$2,(14) = 2 + 0,(14) = 2 + \frac{14-0}{99} = \frac{212}{99}$$

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ - числа, которые не являются рациональным, то есть не может быть представлено в виде обыкновенной дроби может быть представлено в виде бесконечной непериодической десятичной дроби.

$$\frac{1}{\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}}$$

$$\frac{\sqrt{4\sqrt{2} + 2\sqrt{6}}}{1 + \sqrt{3}}$$

Практическое задание:

Найдите целые числа n , при которых дробь $\frac{6n^2+n-27}{3n+2}$ является целым числом.

Решение:

$$\begin{aligned} \frac{6n^2+n-27}{3n+2} &= \frac{6n^2+4n-3n-27}{3n+2} = \frac{6n^2+4n}{3n+2} - \frac{3n+27}{3n+2} = 2n - \frac{3n+2+25}{3n+2} = \\ &= 2n - \frac{3n+2}{3n+2} - \frac{25}{3n+2} = 2n - 1 - \frac{25}{3n+2} \end{aligned}$$

Для того, чтобы дробь была равна целому числу нужно, чтобы знаменатель $3n+2$ имел $n = -9, -1, 1$

СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ



Средним арифметическим n чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ называется

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n}$$

Средним геометрическим n чисел $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ называется

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n}$$

Абсолютная величина (модуль)

Модулем или **абсолютной величиной действительного числа** называют:

1. Само число, если оно положительное ;
2. Ноль (нуль), если число равно нулю;
3. Минус число, если оно отрицательное

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad |x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

СВОЙСТВА МОДУЛЯ

Определение	Формулы
$ x = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$	<ul style="list-style-type: none">• $x \geq 0$• $-x = x$• $x \geq x$• $x + y \leq x + y$• $x - y \geq x - y$• $x \cdot y = x \cdot y$• $x : y = x : y$• $x ^2 = x^2$

Геометрический смысл:

«расстояние на координатной прямой от начала отсчёта до точки, обозначающей соответствующее число»

Отношения, пропорции и проценты

Отношение двух чисел – частное двух чисел.

Отношение величин – отношение значений этих величин, измеренных одной и той же единицы измерения.

Пропорции – равенство двух отношений:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ или } a:b = c:d \Leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$$

Прямо пропорциональная
зависимость: линейное
изменение величин

Обратно пропорциональная
зависимость: нелинейное
изменение величин

Процент – сотая часть числа (%): $\frac{1}{100} = 0,01 = 1\%$

Сложный процент – процент, начисленный на процент: $C = C_0 \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$

Практические задания:

1. Из 20 тонн руды выплавляют 10 тонн металла, содержащего 80% примесей. Определите процент примесей в руде.

Решение:

Количество примесей в 10 тоннах металла $m_1 = 10 \cdot \frac{80}{100} = 8$.

Количество чистого металла $m_2 = 10 - 8 = 2$.

Процентное содержание чистого металла в руде $\frac{2}{20} \cdot 100\% = 10\%$.

Процентное содержание примесей в руде $100\% - 10\% = 90\%$.

Практические задания:

2. Найдите число, если известно, что 55,5 составляет 18,75% этого числа.

Решение:

Пусть x – неизвестное число.

Тогда:

$$\frac{55,5}{x} = \frac{18,75}{100}$$

По свойствам пропорции $x = \frac{55,5 \cdot 100}{18,75} = 296$.

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ

Определение:

Последовательность, у которой задан первый член a_1 , а каждый следующий равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом d , называется арифметической прогрессией:

$a_{n+1} = a_n + d$, где d – разность прогрессии.

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n$$

$$a_n = a_k + d(n - k)$$

$$a_n + a_m = a_k + a_l, \text{ если } n + m = k + l$$

$$S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} n$$

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ

Определение: Последовательность, у которой задан первый член $b_1 \neq 0$, а каждый следующий равен предыдущему, умноженному на одно и то же число $q \neq 0$, называется геометрической прогрессией:

$b_{n+1} = b_n q$, где q – знаменатель прогрессии.

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

$$b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$$

$$S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$$

$$b_n = b_k q^{n-k}$$

$$b_n b_m = b_k b_l, \text{ если } n + m = k + l$$

Бесконечно убывающая геометрическая

прогрессия $S = \frac{b_1}{1-q}$