

Ответьте на вопрос:

1) Что включает в себя понятие «личная гигиена»?



Заболевания, передаваемые половым путем(ЗППП) и меры их профилактики.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: объяснять последствия заболеваний, передаваемых половым путем и меры их профилактики.



ЦЕЛИ УРОКА:

**-ИЗУЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ;
ОБЪЯСНЯТЬ СИМПТОМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И МЕРЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ**

**Критерии
оценивания**

**описывает симптомы заболеваний, передающихся половым путем;
объясняет последствия заболеваний, передаваемых половым путем и
меры их профилактики**

Игра «Верно-неверно»

- 1) ЗППП передаются только половым путем.
- 2) Возбудителями ЗППП являются не только вирусы, но и бактерии, простейшие, «грибы» и паразиты.
- 3) Хламидиоз – самое распространенное ЗППП на сегодняшний день.
- 4) Такой контрацептив, как противозачаточные таблетки, способен предотвратить заражение ЗППП.
- 5) Использование презерватива является единственным средством профилактики ЗППП.
- 6) Некоторые ЗППП можно лечить самостоятельно.

Что означает ЗППП?



- Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), или инфекции, передаваемые половым путём (ИППП) — под этими терминами понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которых является половой контакт.
- Для заболеваний, которые передаются половым путем, довольно часто характерно отсутствие симптоматики.
- При этом довольно часто ЗППП перестают себя проявлять, что может указывать на их обострение.

1. Что означают слова «группа риска»?

Группа риска – определенная категория людей, которые скорее, чем кто-либо другой, могут заразиться опасной болезнью из-за особенностей своего поведения.

2. Кто относится к группе риска?

3. Почему подростки являются группой риска по распространению заболеваний, передающихся половым путем?

- часто меняют сексуальных партнеров (раскованное сексуальное поведение);
- не сформированы навыки безопасного сексуального поведения;
- сексуальные отношения носят «подпольный» характер;
- не используют презервативы и др.

Симптомы ЗППП

1) Жжение или зуд в области половых органов



2) Покраснение в области половых органов



3) Дискомфорт в области половых органов



4) Сыпь в области половых органов



5) Выделение из половых органов



6) Неприятный запах от половых органов



7) Мочиспускание участилось и/или стало болезненным



8) Боль в области половых органов и/или малого таза



ЗППП
ИППП
Венерические заболевания



Инфекционные заболевания,
которые наиболее часто
передаются половым путем

Некоторые ЗППП могут передаваться и другими путями:

- парентеральным (ВИЧ, гепатиты В,С);
- воздушно-капельным (лихорадка Эбола);
- прямым контактом (чесотка);
- вертикальным (хламидиоз, ВИЧ).

Работа в группах

Заболевания:

● Критерии изучения:

- СПИД;
- сифилис;
- гонорея;
- гепатит В,С

- диагностика;
- причины;
- СИМПТОМЫ;
- лечение;
- профилактика.

Критерии оценивания работы в группе

- Умеет работать в группе: обсуждать ход работы, распределять обязанности, выполнять их.
- Демонстрирует личные качества сотрудничества, настойчивости, ответственности.
- Шаги по выполнению работы являются правильными, соответствуют плану и времени выполнения (работа закончена вовремя).
- Владеет способами самоконтроля, самооценки (рефлексии).

Задание. Выпишите в тетрадь номера, под которыми, по-вашему мнению, обозначены ЗППП.

- 1) ВИЧ-инфекция;
- 2) Бруцеллез;
- 3) Трихомониаз;
- 4) Корь;
- 5) Гонорея
- 6) Паратиф;
- 7) Сифилис;
- 8) Герпес;
- 9) Скарлатина;
- 10) Цитомегаловирус.

Возбудители ЗППП:

- 1) **Бактерии** (сифилис, гонорея);
- 2) **Вирусы** (ВИЧ, СПИД, герпес);
- 3) **Простейшие** (трихомониаз);
- 4) **«Грибы»** (кандидоз);
- 5) **Паразиты** (чесотка).

Характеристика некоторых видов ЗППП

СИФИЛИС

Это общее инфекционное заболевание, поражает все органы и ткани человека. Возбудитель **бледная трепонема**. Инкубационный период от 8 до 100 дней. Больной заразен с третьей недели инкубационного периода. У сифилиса различают три клинических периода, которые последовательно сменяют друг друга:

- первичный,
- вторичный,
- третичный.

Пути передачи: половой, бытовой (через общие предметы), инъекционный и контактный (от матери к ребенку). Если своевременно не проводится лечение, наступает поражение внутренних органов, центральной нервной системы, нарушение зрения. *Вакцины не существует.*

Характеристика некоторых видов ЗППП

ГОНОРЕЯ

Передается преимущественно половым и контактным путем. Заражение бытовым путем происходит редко, хотя бактерия может сохраняться на неповрежденной, сухой коже около 4 часов.

Гонорею вызывает микроорганизм, который называется "**гонококк**". Иногда этот организм может находиться в организме не вызывая никаких симптомов. *Около 2% женщин являются бессимптомными носителями гонококка.*

Гонорея опасна тем, что *может привести к бесплодию, также поражаются мочевой пузырь и почки.* У новорожденных чаще наблюдается поражение глаз, которое может приводить к слепоте.

Первые симптомы заболевания возникают через 2-5 дней после контакта с больным партнером. Обычно первый признак - это чувство жжения и боли в мочеиспускательном канале при мочеиспускании. Иммунная память на это заболевание отсутствует.

Характеристика некоторых видов ЗППП

ХЛАМИДИОЗ

Ежегодно в мире регистрируется 89 млн. новых случаев хламидиоза. Хламидиоз в настоящее время является **самым распространенным заболеванием**. От хламидиоза умирают очень редко.

Вызывается заболевание внутриклеточным паразитом- **хламидией** – неподвижной бактерией небольших размеров. Она погибает лишь при температуре кипения воды.

Хламидийная инфекция угрожает здоровью не только взрослых людей, но и детей, новорожденных и еще не рожденных малышей.

По данным статистики молодых людей, инфицированных хламидиями около 30 % . Хламидиозом страдают 60% женщин и 50% мужчин.

Хламидиоз часто протекает без выраженных признаков или вообще никак не проявляется. Без лечения хламидиоз как бы "консервируется" в организме.

У человека нет естественной невосприимчивости к хламидийной инфекции и нет приобретенного иммунитета.

Характеристика некоторых видов ЗППП

ТРИХОМОНИАЗ

Заболевание вызывается простейшими вида **Trichomonas vaginalis**. Заражение происходит половым путем при контакте с больным или носителем инфекции.

Инкубационный период в пределах от 2 дней до 2 месяцев. При отсутствии лечения заболевание переходит в хроническую форму.

Трихомониаз **часто приводит к бесплодию**. Трихомонадная инфекция может способствовать воспалению мочевого пузыря и почек.



Характеристика некоторых видов ЗППП

ВИЧ-инфекция и СПИД

Учёные и врачи считают, что ВИЧ появился на Земле не более 50 лет назад. До сих пор не удалось найти лекарств, полностью излечивающих СПИД, и способов защитной прививки (вакцинации) от ВИЧ.

СПИД впервые был зарегистрирован в 1981 году в США. Когда были выявлены групповые заболевания мужчин в возрасте 25–45 лет гомосексуальной ориентации.

СПИД быстро получил эпидемическое распространение и сейчас выявлен уже в 130 странах мира.

За годы наблюдения за СПИДом:

- заразилось свыше 42 млн. чел.;
- умерли 28 млн. чел., из них 3,6 млн. детей в возрасте до 15 лет;
- в день инфицируется около 16 тыс. человек.

Пути заражения ВИЧ: половой, парентеральный, вертикальный (15-30%).

В первое время после инфицирования, ВИЧ ничем себя не проявляет, но при этом постепенно разрушает иммунную систему человека.

Это происходит постепенно, в течение нескольких (до 10–15) лет. Когда иммунная система перестает работать, развивается **СПИД**. Это последняя стадия ВИЧ-инфекции. При СПИДе даже безобидные для здорового человека инфекции могут привести к смерти.

Распределите утверждения по степени риска заражения ЗППП

(риска нет  ; низкий риск  ; высокий риск )

- 1) Поцелуй в щеку
- 2) Глубокий поцелуй
- 3) Пользование общей посудой
- 4) Пользование общим туалетом
- 5) Пользование чужой зубной щеткой
- 6) Укусы насекомых
- 7) Пользование чужим полотенцем
- 8) Рукопожатие
- 9) Незащищенный сексуальный контакт

6

1,8

2,3,4,5,7,9


Причины увеличения ЗППП

- свобода половых отношений;
- отсутствие необходимого полового воспитания и просвещения;
- пропаганда «свободной любви» в СМИ, Интернете;
- пренебрежение походом к врачу;
- появление различных контрацептивов.



Профилактика ЗППП

- воздержание от «случайных» связей;
- использование презерватива;
- сдавать анализы на различные ЗППП и наблюдаться у врача.



Распознавание и лечение ЗППП

- появление необычных симптомов (дискомфорт в нижних отделах живота; появление на коже или слизистых оболочках пятен, язвочек, пузырьков; увеличение лимфоузлов и пр.);
- поставить точный диагноз и выявить причину заболевания может только врач (внешний осмотр и лабораторные исследования на инфекции);
- лечение подбирает врач в зависимости от вида инфекции;
- лечение проходят все половые партнеры;
- во время лечения обязательное использование презерватива.



Игра «Верно-неверно»

- 1) ЗППП передаются только половым путем.
 - 2) Возбудителями ЗППП являются не только вирусы, но и бактерии, простейшие, «грибы» и паразиты.
 - 3) Хламидиоз – самое распространенное ЗППП в нашей стране за последние 10 лет.
 - 4) Такой контрацептив, как внутриматочные таблетки, способен предотвратить заражение ЗППП.
 - 5) Использование презерватива является единственным способом профилактики ЗППП.
- Какие из перечисленных ЗППП можно лечить самостоятельно.

Верно: 2,3

Выполните задание
«Согласен», «не согласен», «не знаю»

- 1) Проблема распространения ЗППП касается только наркоманов, лореток и гомосексуалистов.
- 2) Принудительное обследование на ЗППП – единственный способ сдержать распространение инфекции.
- 3) Все больные ЗППП должны быть изолированы.
- 4) Дети родителей, больных ЗППП, не должны посещать плавательные бассейны.

«Всё имеет смысл, пока мы здоровы»



«Здоровье не купишь – его разум дарит»
Народная мудрость