

Көз жарақаттары

Орындаған: Жұманов А

Қабылдаған: Нұржауов С

Тобы: ЖМ-216

Жоспа

р:

Кіріспе

Негізгі бөлім:

- 1. Көз мүшелерінің контузиясы**
 - * **Көз алмасының контузиясы**
 - * **Қасаң қабық контузиясы**
 - * **Көз бұршағының контузиясы**
- 2. Көздің күйіктері**
 - * **Көз күйігінің түрлері**

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

Көз мүшелерінің контузиясы

Клиникалық ағымы бойынша көз контузиясы көп факторлы болып келеді. Дәнекер қабық астына қан кұйылудан, көздің езілуіне дейін алып келеді. Олар жарақаттаушы фактордың көз шарасына және оның қосымшаларына әсерерінен дамиды. Кей жағдайда жарақаттар әсерінен көз контузиясымен бірге жабық бас ми жарақаттары жүреді.



DATALIFE ENGINE
SOFTNEWS MEDIA GROUP

Контузияның клиникалық көрінісі:

Контузияға тән клиникалық белгілерге қабақтың астына, дәнекер тінге және көздің басқа құрылымдарына Қан құйылу жатады. Олар әр көлемдегі және әр пішінді айқын шекарасы бар қызыл дақтар.



Көз алмасының контузиясы

Ол доғал заттың соққысынан болуы мүмкін, осы кезде көз құрылымдарының барлық бөлігі зақымданады. Кқбінесе дәнекер қабық асты, алдыңғы камера, тор қабыққа қан кұйылады. Қарашықтың жыртылуы немесе көз бұршағының жартылай толық шығып кетуі мүмкін.

Клиникалық көрінісі:

**Зақымдалу дәрежесіне
байланысты 3ке бөлеміз.**

1. Жеңіл дәрежесі:

- * Шамалы көрудің төмендеуі**
- * Конъюктива астына қан кету**


2. Орта дәрежесі:

- * Қарашық деформациясы**

3. Ауыр дәрежесі:


- * Көрудің едәуір төмендеуі**
- * Нұрлы қабықтың түбінен үзілуі**
- * Көздің қанға толуы**

Ушиб глазного яблока ■



Қасан қабық контузиясы:

Қасан қабықтың толық қарауытуына байланысты науқастың көру қабілеті нашарлайды. Ол көбіне сыртқы жарақат әсерінен және реактивті гипертензияның әсерінен пайда болады.






Көз бұршағының контузиясы

- * Көз бұршағының контузиясы кезінде оның қалташасы өте сирек жыртылады, бұршақтың қарауытуы ұзақ уақыт өткеннен кейін пайда болады. Көз бұршағының мөлдірлігінің бұзылуы 10% ға дейін байқалады.
- * Көз бұршағының ығысуы жабық жарақаттан болады, соққыдан кейін бұршақтың байламы әлсірейді да үзіледі.

Бұршақтың толық үзілуінен бұршақ алдыңғы камераға шығып кетуі немесе шыны тәрізді денеге түсіп кетуі болады.



Емі

:


Қатаң төсектік тәртіп;

*** көктамырға 30мл 10% NaCl
ерітіндісі;**

*** бұлшық етке 10мл 25% Магний
сульфаты;**

*** ішке глицерин 1кг дене салмағына
1-1,5г**

Көз күйіктері:



ЗАҚЫМДАУШЫ ЗАТТАР БОЙЫНША:

- * ТЕРМИЯЛЫҚ (ОТ, ӨТЕ ЫСТЫҚ ЗАТТАР, PH НЕЙТРАЛЬДІ ӨТЕ ЫСТЫҚ СҮЙІҚТІҚТАР, ЭЛЕКТРТОҚТЫҢ ӘСЕРІ);
- * ХИМИЯЛЫҚ



ЗАҚЫМДАНУ ОРНЫНА ҚАРАЙ:

- * ҚАСАҢ ҚАБЫҚ КҮЙІПІ,
- * КӨЗДІҢ ШЫРЫШТЫ ҚАБАТЫНЫҢ
- * ҚАБАҚТЫҢ ЖӘНЕ БЕДТЕРІСІНІҢ КҮЙІПІ
- * АРАЛАС.

Термиялық күйіктер:

Көзге қайнаған сұйық, қызған метал, кейде от тигенде және т.б кездерде пайда болады. Күйіктің дәрежесі жарақаттаушы заттың температурасына байланысты. Ыстық сұйық, ыстық бу және еріген метал көзге түскенде көздің зақымдануы едәуір кең көлемде болады. Осы жағдайда көз алмасы қатты жарақаттанады.



с. 3. Термический ожог средней степени тяжести (через 4 г). Иностранное тело (свинец) в верхнем своде.


Химиялық күйіктер:

- * Көзге түскен сілтілер мен қышқылдардың әсерінен пайда болады. Сілтілер мен қышқылдар көзге терендей еніп, көздің ыдырауы мен шіруіне әкеледі.
- * Химиялық күйіктер кезінде қасан қабық пен конъюгата көп зақымдалады.



Емі:

- * Физиологиялық ерітіндімен көзді 20 минут бойы жуу. Ерітінділер болмаса таза сумен жуу қажет.
- * Ішке антибиотик, анальгетик беру.
- * Ауыр дәрежесінде шұғыл госпитализациялау және конъюнктиваның күйігінде пайда болған некроз ошағын алып тастау қажет.



Емі.
Қасаң
қабак



Қорытынды:

Қорыта келгенде көз жарақаттары кезінде шұғыл түрде көмек көрсету қажет. Дұрыс уақытында көрсетілген алғашқы көмек түрлі асқынулардың алдын алады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

- «Көз жарақаттары мен аурулары»
Е.Н Нәбиев
- «Офтальмология» Е.А Егоров
- www.Google.com

