

ПМП ПРИ
БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЕ



БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА....

- относится к аллергическим заболеваниям, в которых задействована система бронхов, и в связи с этим создается угроза удушья во время приступов.
- Симптомы бронхиальной астмы тяжелы и поэтому возникает необходимость неотложной помощи, поскольку появляется угроза жизни человеку – в бронхах возникает спазм, повышается секреция слизистой оболочки, которая также отекает, и просвет бронхов значительно сужается



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ:



КЛИНИКА:

- 1-острое проявление симптомов приступа;
- 2-у больного затруднен выдох (так называемая экспираторная одышка);
- 3-дыхание сопровождается шумом и свистом;
- 4-кожа больного обретает синий оттенок (так называемый цианоз);
- 5-при прослушивании легких слышны свистящие хрипы;
- 6-больной занимает положение, в котором ему максимально удобно – сидит с упором на руки.

- Неотложная доврачебная помощь при бронхиальной астме должна проводиться в том случае, когда есть подтверждение, что астма является бронхиальной, а не сердечной. Определить, какая астма развилась у человека, можно по характеру одышки: если при бронхиальной астме человеку тяжело выдохнуть воздух, то при сердечной астме ему тяжело вдыхать.



БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА - АЛГОРИТМ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

- обеспечении покоя больному и обеспечения потока свежего воздуха, если приступ возник в помещении.
- Переводить больного не следует, он должен занимать сидячее положение, которое способствует улучшению дыхательной мускулатуры и облегчает отхождение мокроты.
- Вызвать скорую помощь, если состояние больного очень тяжелое, или же лечащего врача, если по оценкам состояние больного приближено к стабильному.



- Все возможные аллергены, окружающие больного, нужно устранить.
- Больному нужно расстегнуть одежду, если она сдавливает грудь.
- Дать больному воспользоваться ингалятором, который помогает расширить просветы бронхов (с Альбутеролом, Метапротеренолом или Тербуталином).
- Дать больному Димедрол или аналогичного действия медикамент.
- Если улучшения не наступают, больному вводят 60 мг Преднизолона – это снимет воспаление и острое течение приступа.
- Если Преднизолон не облегчил состояние больного, тогда есть угроза возникновения астматического статуса, который оставляет тяжелые последствия на здоровье человека – пациент теряет сознание и может лишиться жизни. В этом случае необходима срочная госпитализация.



*СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!*