




# Стенокардия





**Стенокардия** - форма ИБС, характеризующаяся приступообразным развитием болевого синдрома за грудиной в результате острой кратковременной ишемии миокарда.



# Классификация стенокардии



## 1. Стенокардия напряжения

\* Впервые возникшая стенокардия напряжения – приступы типичных болей в течение 1 месяца

\* Стабильная стенокардия напряжения

\* Прогрессирующая стенокардия напряжения – учащение и изменение характера приступов, снижение эффекта принимаемых препаратов.

## 2. Вазоспастическая (вариантная, особая, спонтанная, Принцметала) стенокардия





Впервые возникшая стенокардия напряжения – приступы типичных болей в течение 1 месяца от появления первых симптомов.



# Стабильная стенокардия напряжения

1 фк – болевые приступы только при чрезмерных физических нагрузках,



2 фк – боль возникает при обычной физической нагрузке, при ходьбе более 500 метров, при подъеме более чем на 1 этаж, при воздействии холодного воздуха, после еды, при эмоциональном стрессе

3 фк – боль возникает при ходьбе обычным шагом по ровной местности на расстояние 100 – 500 метров, при подъеме на 1 этаж.

4 фк – боль возникает при минимальных нагрузках, ходьба обычным шагом менее 100 метров и в покое, при повышении АД, тахикардии, при увеличении венозного притока крови к сердцу при горизонтальном положении.



Прогрессирующая стенокардия напряжения – учащение и изменение характера приступов, снижение эффекта принимаемых препаратов.





## **Нестабильная стенокардия:**

- Впервые возникшая стенокардия напряжения
- Прогрессирующая стенокардия напряжения
- Вазоспастическая стенокардия.
- Ранняя постинфарктная стенокардия (в первые 14 дней после ОИМ ).

# Клиническая картина



Боль приступообразная, давящая, сжимающая, жгучая

Интенсивность от небольшой до интенсивной, до стона и крика

Появляется на высоте физической нагрузки, психоэмоционального напряжения, обильной еды, воздействия холода

Боль прекращается в покое

Кратковременная, длится 2-5 минут, редко до 10 минут


Локализуется за грудиной, реже – слева от грудины, в эпигастральной области, в области левой лопатки, левого плеча.

Иррадиирует в левую руку, нижнюю челюсть, зубы, левую лопатку, спину






**Стенокардия** - форма ИБС, характеризующаяся приступообразным развитием болевого синдрома за грудиной в результате острой кратковременной ишемии миокарда.



Характерен симптом  
«сжатого кулака»  
Боль сопровождается  
страхом смерти  
Боль заставляет больного  
остановиться, не двигаться  
Гиперстезия кожи в области  
боли  
АД повышено  
Купируется в покое или  
нитроглицерином.



## ЭКГ:

Смещение ST на 1-2 мм вниз от изолинии, появление отрицательного коронарного T в одном или нескольких отведениях.





осложнений и т.д.:

1. Уложить больного, успокоить
2. Обеспечить доступ свежего воздуха
3. Дать таблетки Нитроглицерина 0,0005 под язык, повторно через 5 минут трижды или Нитроспрей 1-2 дозы.
4. Антиагреганты: Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) 250 мг разжевать+ Клопидогрел 300 мг внутрь.
5. В-блокаторы: Пропранолол (Анаприлин) 40 мг внутрь
6. ЭКГ
7. Пульсоксиметрия.
8. При купировании приступа – актив участкового врача. При сохраняющихся или рецидивирующих болях расценивать как острый коронарный синдром.