

Отделы нервной системы

По расположению

По функциям

Центральный:  
головной и  
спинной  
мозг

Периферический:  
Нервы и нервные  
узлы


Соматическая  
нервная система

Вегетативная  
нервная система

# Головной мозг

- ▶ Средняя масса 1,5-1,6 кг
- ▶ Состоит из серого (дендриты и тела нейронов) и белого (длинные отростки нейронов) вещества.
- ▶ Мозг защищен тремя оболочками:
  - 1) Наружной – твердой (плотной соединительной ткани)
  - 2) Средней – паутинной (подпаутинное пространство, заполненное спинномозговой жидкостью)
  - 3) Внутренней мягкой (сосудистая, прилегает к мозгу).

# Оболочки головного мозга



# Головной мозг включает пять отделов:

- ▶ Продолговатый
- ▶ Задний (мост и мозжечок)
- ▶ Средний
- ▶ Промежуточный
- ▶ Передний

Стволовую часть мозга образует продолговатый мозг, мост и средний мозг.



Передний мозг



Средний мозг

Таламус  
Гипоталамус

Задний мозг

Мост  
Мозжечок  
Продолговатый мозг  
Спинной мозг

# Продолговатый мозг.

- Является продолжением спинного мозга
- Выполняет рефлекторную и проводниковую функцию.
- Отходят IX-XII пары черепно-мозговых нервов
- Содержит нервные центры следующих рефлексов: дыхания, сердечной деятельности, пищеварения, глотания, жевания, чихания, кашля.

# Задний мозг

- Состоит из варолиева моста и мозжечка.
- Мост появляется только у млекопитающих и выполняет проводниковую функцию. От него отходят V-VIII пары черепно-мозговых нервов.
- Мозжечок отвечает за координацию движений и регуляцию тонуса мышц.

# Средний мозг

- Состоит из четверохолмия (передние и задние бугры) и ножек мозга.

Передние бугры – центр первичных зрительных рефлексов.

Задние бугры – центр первичных слуховых рефлексов.

- От среднего мозга отходят III-IV пары черепно-мозговых нервов.

- Красное ядро среднего мозга участвует в регуляции мышечного тонуса и сокращении мышц



# Промежуточный мозг

- ▶ Состоит из таламуса и гипоталамуса.

Таламус образован серым веществом и является подкорковым центром всех видов чувствительности (кроме обонятельной), участвует в формировании эмоций.

Гипоталамус – участвует в поддержании гомеостаза, в регуляции обмена веществ, в поддержании постоянной температуры тела, состояния сна и бодрствования, регулирует потребление пищи и воды. Гипоталамус выделяет гормоны (окситоцин, вазопрессин) и рилизинг - факторы (вливают на синтез гормонов гипофиза).


# Передний мозг

- ▶ Представлен большими полушариями
- ▶ Полушария соединены между собой мозолистым телом
- ▶ Каждое полушарие делится на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную.
- ▶ Доли отделены друг от друга бороздами.

Между лобной и теменной находится центральная (Роландова борозда); между височной, лобной и теменной – латеральная (Сильвиева); между теменной и затылочной – теменно-затылочная борозда.

- ▶ Левое полушарие отвечает за абстрактно-логическое мышление, правое за образное.

## Доли коры больших полушарий.



Лобная Центральная борозда


Боковая  
борозда

Теменная доля

Теменно-  
затылочная  
борозда

Височная  
доля

Затылочная  
доля





- ▶ Толщина коры 1,3-5 мм. Общая площадь 2000 см<sup>2</sup>, количество нейронов 10-14 млрд.
- ▶ В КБП происходит анализ всех раздражений, поступающих из внешней и внутренней среды. В ней выделяют отдельные группы клеток-нейронов – ядра, в которых точно проецируются все структуры периферического рецептора.

# Лобная доля.

- ▶ Самая крупная 29% всей поверхности коры.
- ▶ Отвечает за мышление и интеллект, в ней находятся речевые и двигательные центры.
- ▶ В целом, повреждение лобной доли из-за удара по голове, инсульта, опухоли и заболеваний может вызвать следующие симптомы, такие как:
  - 1) проблемы с речью;
  - 2) изменение личности;
  - 3) плохая координация;
  - 4) трудности с импульсным управлением;
  - 5) проблемы с планированием.



# Височная доля

- ▶ Функция височной доли связана с восприятием слуховых, вкусовых, обонятельных ощущений, анализом и синтезом речевых звуков, механизмами памяти. Основной функциональный центр верхнебоковой поверхности височной доли находится в верхней височной извилине. Здесь располагается слуховой, или гностический, центр речи (центр Вернике).
- ▶ Хорошо изученной первичной проекционной зоной является слуховая, которая расположена в глубине латеральной борозды

# Затылочная доля.

- ▶ Функция затылочной доли связана с восприятием и переработкой зрительной информации, организацией сложных процессов зрительного восприятия.
- ▶ В разных отделах затылочной доли воспринимаются линии, фигуры, движения и цвет.

При поражении затылочной доли отмечают: может наблюдаться искажение зрительных объектов, иллюзорное смещение изображений с одной стороны зрительного поля в другое, сохранение зрительного образа после удаления объекта из поля зрения. Двустороннее поражение затылочных долей приводит к «корковой слепоте», слепоте без изменений глазного дна и зрачковых рефлексов.

# Теменная доля

- ▶ Отвечает за общую чувствительность (температурная, болевая, осязательная).
- ▶ Кожно-мышечная чувствительность.
- ▶ Управление движением некоторых групп мышц.
- ▶ Распознавание предметов на ощупь

При поражении теменной доли: не узнавание предметов при ощупывании их с закрытыми глазами, невозможность синтезировать образ предмета, больные путают правую половину тела с левой, не могут правильно показать пальцы кисти при назывании их врачом.

# Д/З для 8 Б.

► Заполнить таблицу № 1

Отдел головного мозга	Особенности строения	Функции

- ▶ Заполнить таблицу № 2.

Доля коры больших полушарий	Общая характеристика	Функция

- ▶ Решить тестовые задания см. электронный дневник.