

# КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОФЛЕБИТА

Выполнила:  
Розум София  
Студентка 4 ЛФ  
Группа 1404

Основными задачами консервативного лечения является профилактика продолженного тромбообразования, фиксация тромба к стенкам сосуда, ликвидация воспалительного процесса, а также воздействие на микроциркуляцию и тканевой обмен.

Консервативное лечение НЕ применяется когда:

- ▣ тромбофлебит на уровне голени, леченный в течение 10–14 дней, не поддается регрессу, (вопрос о госпитализации и более интенсивной терапии заболевания)
- ▣ при распространении (восходящем характере) процесса
- ▣ переходе на глубокие вены
- ▣ Есть вероятность отрыва тромба, что может привести к ТЭЛА

# Виды консервативного лечения


Лечение представляет собой комплекс из:

- ▣ Изменение двигательной активности
- ▣ Медикаментозное лечение
- ▣ Компрессионная терапия
- ▣ Физиотерапия
- ▣ Местное лечение
- ▣ Санаторно-курортное лечение
- ▣ Гирудотерапия
- ▣ Соблюдение диеты



# Изменение двигательной активности

- Больным показана двигательная активность
- Ограничение активности необходимо при тромбозе глубоких вен с флотацией верхушки (в этом случае больному показан полный покой)
- Специальная гимнастика, щадящие виды спорта



# Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение тромбофлебита направлено на уменьшение вязкости крови, борьбу с воспалением, отеком и профилактику осложнений.

Назначают следующие препараты:

- ▣ флеботоники (детралекс, веносмин, вазокет, веноплант)
- ▣ противовоспалительные лекарства (ортофен, этолфорт, ранселекс, синметон)
- ▣ дезагреганты (аспирин, клопидогрел, тиклид)



# Медикаментозное лечение

- Ангиопротекторы (производные рутина – венорутон)
- ферменты, разжижающие кровь (трипсин, хемотрипсин, стрептокиназа)
- антикоагулянты (гепарин, варфарин, синкумар)
- Антибиотики (амоксцициллин, цефалоспорин)



# Компрессионная терапия

- вне зависимости от локализации процесса, с первых суток заболевания используют эластичный бинт (в течение первых 10-14 суток показана компрессия на протяжении 24 часов)
- Затем после стихания воспалительного процесса нужно применять компрессию только в дневные часы, для этого используется специально подобранный компрессионный трикотаж (2-3 класса компрессии)



# Физиотерапия

Физические методы  
лечения назначают с  
целью:

- ▣ устранить воспалительный процесс;
- ▣ снизить болевые ощущения;
- ▣ снизить способность крови к свертыванию;
- ▣ восстановить гемодинамику;
- ▣ замедлить прогрессирование процессов





# Местное лечение

Местные лекарственные препараты классифицируют по основному действующему веществу. Так, различают мази и гели на основе:

- гепарина,
- веноактивных препаратов (флебопротекторов);
- нестероидных противовоспалительных средств (НПВС);
- кортикостероидов;
- Ионизирующего серебра



# Санаторно-курортное лечение

Больным, находящимся на стадии выздоровления, не ранее, чем через 12-16 недель после тромбоза глубоких вен нижних конечностей, показано лечение в санаториях, преимущественно с бальнеологической (Сочи, Пятигорск, Белокуриха и прочие) и грязелечебной




Я ❤️  
СОЧИ

# Гирудотерапия

Гирудинотерапию (пиявки) следует применять только при остром тромбофлебите, если у больного имеются противопоказания к антикоагулянтам.

- ▣ понижает вязкость и свертываемость крови
- ▣ снимает спазм артериальных сосудов



# Соблюдение диеты



**Спасибо за  
внимание!**

