


ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет»

Среднеазиатский очаг происхождения культурных растений

Выполнил:
студент ББ-301
Добровольский А.
Н.

2017 г.



Центры происхождения культурных растений: 1 – Тропический центр; 2 – Восточноазиатский; 3 – Среднеазиатский; 4 – Переднеазиатский; 5 – Средиземноморский; 6 – Абиссинский; 7 – Центральноамериканский; 8 – Южноамериканский.



В этот очаг входят земли Западного Тянь-Шаня, Таджикистана, северной части Пакистана, Узбекистана, Афганистана и северо-западной части Индии.

Климат

Местные условия характеризуются умеренной продолжительностью вегетации, высокими температурами с сильными сезонными и суточными колебаниями и очень низким уровнем увлажнения. Данная область испытала сильное воздействие Переднеазиатского и Китайского центров. По этой причине она является вторичным очагом для большинства здешних плодовых сортов.

Примеры растений


Овёс — **первичный очаг**; Люпин; Чина — спорно; Лён — прядильные формы; Клевер — **первичный очаг**; Опивковое дерево; Рожковое дерево; Лавр благородный; Виноград — **основной очаг**; Дуб пробковый; Горчица белая; Капуста белокочанная; Капуста краснокочанная; Кольраби; Брокколи; Брюссельская капуста; Савойская капуста; Листовая капуста; Рапс — спорно (возможно в западной европе); Горох — совместно с Переднеазиатским центром; Боб садовый; Кабачок (и некоторые другие разновидности тыквы обыкновенной) — **вторичный очаг**; Морковь; Петрушка — первичный очаг; Пастернак; Сельдерей; Свёкла; Мангольд; Редька; Редис; Репа — **вторичный очаг**; Брюква; Турнепс; Скорцонера испанская; Козлобородник пореелистный; Цикорий; Салат — совместно с Переднеазиатским центром; Щавель кислый; Ревень; Спаржа; Артишок; Катран; Мелисса лекарственная; Иссоп; Змееголовник; Мята; Анис; Кориандр; Фенхель; Тмин; Огуречная трава; Хрен; Сафлор; Укроп.

Овёс



Клевер

Кабачок





Виноград

Репка

