


Мозжечок (cerebellum)


- Мозжечок располагается в задней черепной ямке над продолговатым мозгом и варолиевым мостом.
- Развивается из заднего мозга в связи с развитием статики и двигательной сферы.


Масса мозжечка у человека составляет 150 г, объем - 160 куб. см.

Мост и мозжечок (отделы заднего мозга)



Сагиттальный разрез головного мозга






В мозжечке различают объемистые боковые части или полушария (*hemispheria*) и расположенную между ними узкую среднюю часть – червь (*vermis*).

На разрезе мозжечка видны многочисленные борозды и узкие извилины – «древо жизни», *arbor vitae*.

Серое вещество покрывает поверхность мозжечка и располагается в глубине полушарий (глубокие или собственные ядра). Белое вещество – под корой.

Кора мозжечка



- 1 – молекулярный слой;
- 2 – ганглионарный слой;
- 3 – зернистый слой;
- 4 – белое вещество.

Наличие структурированной коры относит мозжечок к интеграционным центрам головного мозга.

ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА КОРЫ МОЗЖЕЧКА

1 слой – МОЛЕКУЛЯРНЫЙ:

- **корзинчатые нейроны;**
- **звездчатые нейроны - мелкие и крупные;**
- **глиоциты и сосуды.**

2 слой – ГАНГЛИОНАРНЫЙ:

- **грушевидные нейроны Пуркинье**
- **глиоциты и сосуды.**

3 слой – ЗЕРНИСТЫЙ:

- **клетки – зерна;**
- **большие звездчатые нейроны (клетки Гольджи)**
с коротким и длинным аксоном;
- **веретеновидные горизонтальные нейроны;**
- **глиоциты и сосуды.**

Ганглионарный слой содержит один ряд однотипных клеток. Это грушевидные нейроны, или клетки Пуркинье (у человека их 30 млн.).

Размер тела грушевидных нейронов составляет **35 - 60 мкм.**

Молекулярный слой


По ширине - самый большой, а по концентрации нейронов - самый бедный;
содержит клетки двух видов:
звездчатые и корзинчатые.

Клубочки мозжечка - скопления терминальных ветвлений отростков различных нейронов мозжечка и моховидных волокон.

Клубочек окружён капсулой из глиальных клеток.

Вокруг клубочка расположены скопления клеток-зёрен.

Фрагмент клубочка мозжечка



Серое вещество мозжечка представлено подкорковыми (глубокими) ядрами:

- ядро шатра (*n.fastigii*) - регуляция работы вестибулярного аппарата;
- шаровидное (*n.globosus*) и пробковидное (*n.emboliformis*) ядра - регуляция работы мышц туловища;
- зубчатое ядро (*n.dentatus*) -(регуляция работы мышц конечностей).

Связи мозжечка со спинным и головным мозгом

1. Мозжечок получает непрерывные импульсы от суставов и мышц всего тела, а также от вестибулярного аппарата. Эти импульсы достигают мозжечка через нижние ножки.

Обратные импульсы идут через верхние ножки к красным ядрам и через рубро - спинальный , вестибуло-спинальный тракты и задний продольный пучок достигают ядер передних рогов спинного мозга или двигательных ядер ЧМН.

2. Можечок – часть экстрапирамидной системы (ЭПС). Через верхние ножки импульсы от него идут в красные ядра среднего мозга, а оттуда через зрительные бугры в подкорковые ядра полушарий большого мозга.
3. Можечок связан с корой головного мозга: от коры мозжечка волокна идут к зубчатому ядру, от него через верхние ножки - к красному ядру, зрительному бугру и, наконец, к коре больших полушарий.

ФУНКЦИИ МОЗЖЕЧКА:

1. Как представитель ЭПС мозжечок координирует и контролирует сложные и автоматически выполняемые двигательные акты.
2. Поддержание позы и равновесия.
3. Мозжечок – орган сенсомоторной интеграции.
4. Мозжечок – высший центр симпатической нервной системы.

Если отсутствует $\frac{1}{2}$ коры мозжечка, то все движения выполняются без проблем, особенно если они делаются медленно.

Чтобы возникли мозжечковые симптомы, патологические изменения должны затронуть глубокие ядра мозжечка.



Спасибо
за внимание!