

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВИДООБРАЗОВАНИЕ

т.д. Такой способ видообразования самый распространенный и наиболее изученный; он называется географическим или аллопатрическим видообразованием .

Аллопатрическое видообразование - (от латинских слов *allo* - разный и *patria* - родина).

Наиболее яркие примеры географического видообразования -
Процесс видообразования может начаться благодаря комплексы близкородственных видов, формирующих возникновению различного рода географических преград кольцевые ареалы.



Между популяциями вида - гор, морей, пустынь, ледников и

т.д. Такой способ видообразования самый распространенный и наиболее изученный; он называется географическим или аллопатрическим видообразованием .

Аллопатрическое видообразование - (от латинских слов *allo* - разный и *patria* - родина).

Наиболее яркие примеры географического видообразования -
комплексы близкородственных видов, формирующих кольцевые ареалы.

"Комплекс форм" больших белоголовых чаек



Географическое видообразование гавайских цветочниц

Попугайная цветочница

Питается семенами и ягодами



Серпоклювка
Добывает насекомых из-под коры деревьев



Хохлатая цветочница

Питается нектаром цветов



Изменение генетического состава и морфологического облика популяций может происходить в силу чисто случайных причин.

*Такое явление называется **дрейфом генов** или генетико-автоматическими процессами.*



- *Британский подвид благородного оленя сформировался в течение 8000 лет со времени образования пролива Ламанш. Когда же несколько пар этого вида эмигрировали в Новую Зеландию, то за несколько десятилетий местные олени успешно освоили новые местообитания и стали сильнее отличаться от своей родительской популяции, чем британский олень от материковой расы.*

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ

Докопуляционные изолирующие механизмы (механизмы, препятствующие межвидовому скрещиванию)

1. потенциальные партнеры не встречаются
2. потенциальные партнеры встречаются, но не спариваются
3. копуляция не приводит к осеменению

*Послекопуляционные механизмы
(механизмы, понижающие успешность межвидового скрещивания)*

1. осеменение происходит, но яйца не оплодотворяются
2. яйца оплодотворяются, но зародыш гибнет
3. зародыш развивается нормально, но гибриды менее приспособлены к условиям существования, чем родительские виды
4. гибриды вполне жизнеспособны, но частично или полностью стерильны



- Среди рода жужелиц есть немало видов-двойников, практически не отличимых внешне друг от друга. Скрещивания между разными видами невозможны из-за различия в строении половых органов этих насекомых. Кроме того жужелицы способны определять свою видовую принадлежность по запаху. Самки жужелиц выделяют феромоны - пахучие вещества,

Кряква и шилохвост часто гнездятся бок о бок друг с другом, населяя пресно-водные водоемы лесной полосы. Эти виды очень хорошо различаются друг от друга по окраске и брачным ритуалам, и в природе практически не гибридизируются. Тем не менее, в зоопарках смешанные пары между крякой и шилохвостом - не редкость. Большинство яиц в кладках смешанных пар оказываются неоплодотворенными, но из оплодотворенных яиц вылупляются вполне жизне-способные и плодовитые гибриды. Брачное поведение гибридов нарушено и представляет собой мозаику элементов, свойственных родительским видам, в следствие чего им трудно сформировать брачную пару в природных условиях.

Шилохвост



Кряква

